



de skor

v.w.g. texel 1984 no. 4


L. DijkseN

DE SKOR, orgaan van de VWG- Texel.

3^e jaargang nr. 4
augustus 1984

INHOUD

-Programma	1
-Zeetrek telling	2
-Waa lenburgerdijkje; verslag van 12 tellingen in 1983	4
-De broedvogels van "De Dennen"	10
-Waarnemingenrubriek	13
-Bibliotheek	14
-Bestuur	14



PROGRAMMA.

Zaterdag 8 september: fietsexcursie tussen Ceres en de Bol.
Vertrek vanaf Ceres om 9.00 u.

Woensdag 24 oktober: nachtextcursie naar de vuurtoren om de trek te bekijken. Nieuwe maan! Vertrek 21.00 u. vanaf Aankoopcentrale.

Zaterdag 27 oktober: simultaantelling trekvogels vanaf verschillende plaatsen. Begin half uur voor zonsopgang tot 12.00 u.

Mededelingen volgende Skor.

Teldata Kampeersnol: 18 aug., 1 sept., 15 sept., 29 sept., 13 okt., 27 okt., 10 nov. en 24 nov.

ZEETREKTELLEN OP TEXEL.

Het zeetrekten stond in juni op een bijzonder laag pitje (slechts 4 uurtjes geteld). De vaste tellers hadden het in die maand blijkbaar te druk om al die zeldzame vogels welke rond half juni op het eiland zaten in de kijker te krijgen (hetgeen overigens aardig lukte). In juli hebben de helden wat op hun lauweren gerust want verder dan 21 uur kwamen ze niet (misschien werden er nog ergens een paar uurtjes achtergehouden, maar van veel invloed op dit verslagje kunnen ze niet zijn). Nou was er ook maar weinig te zien boven zee, bovendien was het meestal lekker koud en woei het vaak vervelend hard, zodat de zin niet erg stond op blauwbekken aan het strand. Maar Egge Boerma, Louis Witte (hé Richard waar was je?) en ondergetekende hebben dat dus wel enkele uren gedaan en zagen daarbij onder meer het volgende.

JUNI-JULI.

Fuut: op 15-7 1 N en op 24-7 eerst 2 Z (heel ver weg) en even later 2 adulte exx. N heel dichtbij.

Noordse stormvogel: 5-7 1 Z.

Noordse pijlstormvogel: 30-7 1 ex. 2 door de branding met harde aflandige zuidenwind (met het blote oog herkenbaar!).

Jan van Gent: vrij regelmatig, maar niet veel gezien, de meeste op 25-6: 8 tp en 4-7 9 N en 1 tp.

Aalscholver: 15-7 1 Z en 29-7 1 Z.

Blauwe reiger: 24-7 4 N.

Bergeend: af en toe vlogen kleine groepjes naar noord, op weg naar de Duitse slagpennen-bocht; bijv. op 18-7 twee groepjes van 9 N; deze vogels kwamen eigenlijk meer uit het westen gevlogen, mogelijk zijn deze vogels afkomstig uit Engeland.

Wilde eend: 4-7 7 N, 9-7 6 Z.

Tafeleend: 9-7 7 Z.

Eider: 2-7 18 Z.

Zwarte zeeëend: in alle uren gezien, meestal enkele tientallen die wat heen en weer vlogen, af en toe ook grotere aantallen, op 15-7 de grootste: 737 Z en 100 N in 2 uur.

Middelste zaagbek: 15-7 5 N.

Scholekster: max. 20 exx. op het strand rondlopend; op 29 en 30-7 19 Z in 2 uur.

Kievit: 9-7 50 Z in 2 uur en 30-7 38 Z in 2 uur.

Goudplevier: 19-7 8 Z en 30-7 16 Z in 2 uur.

Steenloper: onder meer op 25-7: 4 N en 30-7: 4 Z.

Wulp: de meeste op 2-7: 4 Z.

Regenwulp: onder meer gezien op 9-7: 2 Z.

Rosse grutto: in juli maximaal 45 tp; op 25-6 alweer 1 Z.

Tureluur: 9-7 15 Z.

Groenpootruiter: op 9-7 tamelijk veel: 30 Z in 2 uur.

Drieteenstrandloper: de eerste exx. weer terug op 19-7: 5 N, 24-7 1 Z en 10 N en daarna op 25-7 11 N en 15 tp.

Er werden nog wel meer steltloper-soorten gezien, maar daarvan waren de aantallen zo klein, dat het geen naam mocht hebben.

Kleine jager: 3-7 1 lichte fase Z en 21-7 3 Z (w.o. 1 lichte).

Grote mantelmeeuw: op 24-7 de meeste: 17 Z in 1 uur.

Kleine mantelmeeuw: in elk uur met 10-15 exx. aanwezig en af en toe grotere groepen foeragerend op zee (max. 50 exx.). Nog geen zuidwaartse trek vastgesteld.

Kokmeeuw: op twee dagen met aflandige wind sterke trek, maar ook op andere dagen steeds enkele tientallen per uur naar zuid:

9-7 560 Z in 2 uur, w.v. 23 1^e jaars, 152 2^e jaars en 385 adult.

30-7 735 Z in 2 uur, w.v. 56 1^e jaars, 3 2^e jaars en 676 adult.

Dwergmeeuw: 9-7 3 ad. Z.

Drieteenmeeuw: 29-7 1 1^e jaars N en 30-7 1 1^e jaars N.

Noordse stern/visdief: vanaf begin juli al tamelijk veel visdieven, in de tweede week van die maand ook met jonge vogels, voor de telpost heen en weer vliegend, m.i. iets meer dan in andere jaren (9-7 56 Z, 12 N en 12 tp in 2 uur).

Noordse sterns werden minder gezien (hooguit 3 á 4 exx. per uur) Op 25-7 72 "dieven" Z en 66 visdieven op het strand.

Grote stern: in soms grote aantallen naar zowel zuid als noord vliegend, de vliegrichting afhankelijk van de windrichting (ze vliegen n.l. graag tegen de wind in). Op 13-7 212 Z en 6 N in 1 uur en 19-7 197 Z en 62 N in 1 uur; hieronder bevonden zich na de eerste week van juli in toenemende mate 1^e jaars vogels.

Zwarte stern: 2-7 1 ad. Z.

Dwergstern: pas eind juli vlogen wat meer exemplaren langs, voordien was de soort uitgesproken schaars: 30-7 32 Z in 2 uur.

Frits-Jan Maas.

ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN HET WAALENBURGERDIJKJE DOOR VOGELS.

INLEIDING.

Naar aanleiding van een themanummer over houtwallen in het Vogeljaar stelden we ons de vraag: hoe funktioneert een houtwal op Texel m.b.t. de aanwezige vogels? Houtwallen vormen een nieuw biotoop op Texel. Deze singels zijn plusminus 25 jaar geleden tijdens of na de ruilverkavelingen geplant. Voor ons doel leek het Waalenburgerdijkje (zie kaartje) een geschikt onderzoeksobject.

METHODIEK.

Met 2 tot 4 personen werd het traject lopend vanaf de Nieuwlanderweg tot de Ruigedijk maandelijks afgelegd. In januari is ook het gedeelte vanaf de Waal geteld. Dit bleek in de praktijk onhaalbaar te zijn door de té lange afstand. De gegevens van dit stuk zijn niet in de gegevens opgenomen. De houtwal werd van beide kanten bekeken (slootje springen) en waar het te breed werd ook „van binnen”. De telling van september werd door de overvloedige regens na drie pogingen opgegeven. Wij danken Jet voor het autovervoer terug naar de fietsen, Dick voor de koffie (met melk en zonder suiker, de gulden middenweg!) en Jan die eenmaal in september geprobeerd heeft mee te lopen maar dankzij de regen geheel genezen is teruggekeerd. Verder nog Cor en Trouw die het wel een keer gered hebben.


TEGEGEVENS.

De vogels die we aangetroffen hebben kunnen we indelen in groepen. Deze groepen gebruiken de houtwal op een speciale manier (fig. 1).

- a. Vogels die gebonden zijn aan de houtwal b.v. koolmees.
- b. Vogels die gebonden zijn aan rietkraag en sloot b.v. wilde eend.




- c. Vogels die de houtwal gebruiken als vluchtplaats b.v. huis-mus.
- d. Vogels die prooi of luwte zoeken achter de houtwal b.v. boerenwaluw.



Natuurlijk zijn er vogels die in verschillende categorieën onder te brengen zijn. Zo broedt de ringmus in de singel (groep a), maar in de nazomer zaten ze in het graan en gebruikten de singel als vluchtplaats (groep c).

Verder kunnen we alle vogels nog indelen op de volgende manier:


1. Vogels die het hele jaar voorkomen en ook in de houtwal broeden b.v. koolmees (fig. 2).
2. Broedvogels die alleen in de zomer voorkomen b.v. kleine karekiet (fig. 3).
3. Trekvogels b.v. het goudhaantje (fig. 4).
4. Wintergasten b.v. roodborst (fig. 5).



1. De jaarvogels (fig. 2).


De koolmees (groep a) is in de winter erg konstant. De toename in de zomer wordt voor een groot deel veroorzaakt door de aanwezigheid van jonge vogels. Voor de pimpelmees (groep a) geldt hetzelfde, maar de aantallen zijn kleiner. Ook de winterkoning (groep a) en de meerkoet (groep b) volgen dit patroon. De houtduif (groep c) is in de zomer ook algemener dan in de winter, maar begint wat vroeger te nestelen, zodat hij in maart al op z'n "zomerpiek" is (ca. 45 exx.). De merel (groep a) en het waterhoen (groep b) zijn ook jaarvogel, maar vertonen een omgekeerd beeld dan van de koolmees. In de winter zijn de aantallen veel hoger dan in de zomer (ongeveer 40 om 10). Vooral de waterhoentjes hebben een extreem overwintergedrag. Ze zaten in één grote groep bij het Waalburgerhuis (tip voor winterwadvogeltellers!) De ring- en huismussen (groep c) vertonen ongeveer hetzelfde beeld als de koolmees. In de winter zitten ze in kleine aantallen bij de boerderijen, waar ze later ook broeden. Aardig is de vondst van een kleine kolonie ringmussen in een eksternest bij Phoenix. Vanaf juni tot oktober zijn er hoge aantallen van beide soorten (tot 125 exx.). Vogels die het hele jaar door in konstante aantallen aanwezig waren zijn de wilde eend (groep b, ca. 14 exx), de ekster (groep c, ca. 10 exx) en de zwarte kraai (groep c, ca. 2 exx).

2. De zomervogels (fig. 3).



De kleine karekiet (groep b) is een typisch voorbeeld van zo'n zomervogel. Hij komt aan in mei en is aanwezig tot en met augustus. In juli en augustus zijn de aantallen vrij hoog doordat de jonge vogels meegeteld zijn. Het viel ons op, dat deze jonge vogels niet in het riet, maar in de bomen van de houtwal te vinden waren. Andere zomervogels uit groep b zijn de kuifeend en de witte kwikstaart (ca. 2 exx). Zomervogels uit groep a zijn de fitis, de turkse tortel, de tortelduif, de grauwe vliegenvanger, de grote lijster en de spotvogel. Zij waren in kleine aantallen aanwezig (ca. 2 exx); de fitis was wat algemener (gemiddeld 6 exx.). De groenling en de kneu (beide groep a) zijn minder extreem zomervogels. Ze waren op de herfsttrek duidelijk algemener (ongeveer 5 keer zo veel).

3. De trekvogels (fig. 4).



Het goudhaantje (groep a) heeft een duidelijke piek in oktober en kan als een goed voorbeeld van een trekvogel worden gegeven. Andere duidelijke voorbeelden hiervan zijn de zwartkop (groep a) en de watersnip (groep b), hoewel de aantallen veel lager zijn (zwartkop 4 exx. in juli en watersnip 14 exx. in november). De boerenzwaluw (groep d) en de tijftjaf (groep a) komen zowel in de broedtijd als in de herfst voor; ze broeden er niet. Vogels die zowel in de herfst als in de winter te zien zijn zijn spreeuw (groep c, max. 108 exx. in december) en zanglijster (groep a, max. 28 exx. in oktober).

4. De wintergasten (fig. 5).



Zoals te zien is komt de roodborst (groep a) alleen in de winter in de houtwal voor. Wintervogels uit groep c zijn de fazant met max. 29 exx. in november, de koperwiek, max. 100 in januari en de kramsvogel (5 exx. in november). Een altijd weer spektakulaire wintergast uit groep a is de houtsnip (9 exx. in november). De vink is een wintergast die ook tijdens de herfsttrek in flinke aantallen voorkomt.

Verder zijn er nog een aantal vogels die in te kleine aantallen in de houtwal voorkwamen om ze in een van de bovenstaande categorieën in te delen. Zo vonden we uit groep a sijs: 6 exx. in februari en 1 in november, vlaamse gaai: 1 ex. in mei, barmsijs: 1 ex. in juni, putter: 1 ex. in mei en in december, tuinfluiter: 1 ex. in juli, braamsluiper: 1 ex. in juni, heggemus: 1 ex. in maart, juni en juli, 3 exx. in oktober en 5 exx. in november. Vogels behorend in groep b: visdief: 1 ex. in mei, brilduiker: 1 ex. in februari, bergeend: 4 exx. in juni, slobeend: 9 exx. in oktober, 1 ex. in november en in december,

blauwe reiger: 5 exx. verspreid door het jaar, patrijs: 2 exx. in augustus, waterral: 1 ex. in februari, witgatje: 1 ex. in juli, rietgors: 2 exx. in oktober en 1 ex. in december.

Vogels uit groep c:

kauw: 1 ex. in februari en 5 exx. in oktober.

Vogels uit groep d:

koekoek: 2 exx. in augustus,

boomvalk: 1 ex. in juni,

torenvalk: 2 exx. in oktober,


sperwer: 2 exx. in januari en april en 1 ex. in november,

huishwaluw: 3 exx. in mei en 1 ex. in oktober.

Verder werden we in augustus opgeschrikt door een uil, die niet verder te determineren was.

DISCUSSIE.

De aantallen en de soorten hebben we in grafieken uitgezet (fig. 6 en 7). De x-as hebben we geplaatst op de gemiddelde waarde van de y-as.



Het aantal soorten in de voorjaars- en najaarstrek blijkt hoger te zijn dan in de overige perioden. Dit in tegenstelling tot de aantallen. Deze zijn in het voorjaar lager dan in het najaar. En tot slot willen we, aan de hand van deze gegevens de komende jaren komen tot 4 tellingen per jaar:


- wintertelling in februari
- voorjaarstelling eind april/begin mei
- zomertelling eind juni/begin juli (met jonge vogels)
- herfststelling begin oktober (tijdens de herfsttrek).

Hans
Giel
Lick.

DE BROEDVOGELS VAN DE DENNEN- aflevering 3.


Kris-kras reizen we door de vogelbevolking van de Staatsbossen op Texel. Ditmaal heb ik gekozen voor de vinkachtigen en kraaien. Hoewel de gegevens van 1984 natuurlijk al verzameld zijn, wordt in deze reeks gesproken over de inventarisaties van 1974 tot en met 1983. Om de grafieken te begrijpen mag ik weer verwijzen naar de Skor 1984 nr. 2, pag.6.

Allereerst de vink. Hoewel zaadeters meestal bekend staan vanwege een weinig stabiele, d.w.z. sterk schommelende populatiegrootte, is de vink in ons bos eigenlijk het toonbeeld van konstante zekerheid. Onze broedvogels worden beschouwd als trekvogels, edoch de strenge winter van 78/79 had toch kennelijk invloed op de stand.




Waarschijnlijk door meer variatie in het bos zijn de aantallen de laatste jaren wat hoger dan eind zeventiger jaren. Ioch broeden er vergeleken met gemengde bossen/naaldbossen in zuid en midden Europa naar mijn idee op Texel vrij weinig vinken. In de grafiek van de kleine barmsijs komt duidelijk de vrij gestage toeneming van de soort tot uiting. Opmerkelijk is het heel slechte jaar 1982. Onverklaarbaar!


De kneu schommelt sterk in aantal (zoals het hoort). Hij lijkt een slechte periode weer afgesloten te hebben. Opgemerkt moet worden dat deze soort eigenlijk geen echte bosvogel is. Hij broedt in de Staatsbossen dan ook vrijwel uitsluitend langs de randen.



Dat geldt ook voor de groenling die in z'n lekker schommelende grafiek een soort 2 tot 3-jarige cyclus laat zien. Zwarte kraai, ekster en vlaamse gaai laten alle drie een toeneming zien. Meer variatie in het bos zal voor alle van betekenis zijn, terwijl meer recreatie (=meer afval) langs het bos vooral voor ekster en zwarte kraai waarschijnlijk gunstig is.



Een beetje merkwaardig is het slechte kraaienjaar 1982. Het is echter zo dat vooral de populaties van ekster en zwarte kraai zich tot nu toe niet natuurlijk naast die van de mens mogen ontwikkelen omdat sommigen denken dat ze schadelijk zijn voor de stand van andere vogels. Vooral soorten als fazant en wilde eend zouden negatief door kraaien worden beïnvloed (en zijn dat niet van die geliefde jachtvogels?). Kortom er vindt nogal wat afschot plaats (ook in de broedtijd). Helaas is de grootte van dat afschot (mij) onbekend.




Tenslotte een laatste grafiek die ik hierbij opneem omdat we zojuist de kraaiachtigen behandelden. Het betreft het verloop van alle bosvogels samen, exclusief de fazant en de houtduif. De eerste ontbreekt omdat we deze soort als voortdurend opnieuw uitgezette exoot niet inventariseren, de tweede omdat we niet van alle jaren voldoende gegevens hebben. Aardig konstant dus, al die vogels bij elkaar met twee duidelijke uitschieters. Een dieptepunt in 1979 waaruit blijkt hoe een strenge winter kan ingrijpen op de stand, en een hoogtepunt in 1983. Nog nooit broedden er zoveel vogels in ons bos. Wordt in bepaalde kringen niet verteld dat "al die kraaien" de zangvogelstand decimeren? Ziehier het antwoord. Geen enkel verband is aanwijsbaar!

Adriaan Dijkse.


WAARNEMINGEN NR. 16 (MEI/JUNI 1984).

Veel waarnemingen kreeg ik deze keer niet toegezonden. Was dat vanwege de vakantie of denken sommige vogelaars dat je in de zomer toch niets leuks ziet? Wie dat dacht is wel bedrogen uitgekomen! Wat dat u bijvoorbeeld van een ijsduiker in zomerkleed Of een roodmus, of een rose spreeuw? Of een.....(ja we kunnen echt nog even doorgaan op deze manier, maar leest u de lijst maar door!).




Ijsduiker: 5-7 1 ex. Waddenzee nabij de Kaap (Mark Klomp), op 10-7 nog aanwezig aldaar (FM).
Roodhalsfuut: 21 en 22-7 1 ad. in prachtkleed Waddenzee bij Nieuweschild (FM, CR). Ook gezien door M.Klomp.
Geoorde fuut: 4-6 2 exx. in broedkleed Waddenzee bij Dijkmanshuizen (W.Hirschi), 10-7 al 28 exx. bij Nieuweschild (Eb).
Aalscholver: wordt tegenwoordig bijna het hele jaar door gezien, op 20-6 alweer tenm. 30 exx. wad bij Eendracht (AD&SD).
Zwarte ooievaar: 1-6 1 ex. boven Eyerland (F.Postma).
Toppereend: 30-6 1 ♂ Waddenzee bij Dijkmanshuizen (M.Klomp). Aan het ganzenoverzicht wordt nog gewerkt!
Buizerd: tussen 1-6 en 10-7 8 waarnemingen van 1 ex.; veel in de omgeving van de Westerduinen, maar ook bij de Slufter (steeds hetzelfde ex.; div. waarnemers).

Rode wouw: 15-6 1 ex. boven Den Burg (G.Witte) en 1 ex. NO Westerduinen (L.Daalder); ongetwijfeld dezelfde.
Wespendief: op 2-6 nog 1 ex. de Muy en 1 ex. de Dennen (FM&EB), tussen 18-6 en 13-7 alweer 8 exx. gezien (div. wrns).
Grauwe kiekendief: 17-6 1 onvolw. ♂ Bleekersvallei (CR).
Visarend: 22-5 1 ex. Z de Slufter (SBB) en 1-6 1 ex. N Westerduinen (L.Daalder).
Regenwulp: 18-6 1 ex. weiland de Dennen (FM), 29-6 1^e ex. Noordvlak (LD), na begin juli regelmatig.
Oeverloper: 22-7 14 exx. langs Waddenzeedijk (FM&CR).
Zwarte ruiter: 12-6 1 ex. zomerkleed de Bol (FM).
Kleine strandloper: 23-7 1 adult ex. Mokbaai (FM).
Krombekstrandloper: 20-7 7 exx. zomerkleed Mokbaai (FM&CR).
Grote jager: 29-5 1 ex. NIOZ-haven (G.Witte).
Zwartkopmeeuw: 1 ex. Westerduinen tot 20-6 (AD&LD&L.Daalder).
Drieteenmeeuw: 29-7 1 1^e jrs nabij Oudeschild (M.Klomp), 30-7 1 1^e jrs met lamme vleugel op NRC gebracht.
Poerenzwaluw: op 16-6 nog trek naar NO: 4 exx. de Nederlanden (AD).
Witte kwikstaart: een albino werd op 12-7 door EB gezien en later enige malen op de Bol (M.Klomp, a.).
Kleine klapekster: 8-7 1 ex. Bleekersvallei, gefotografeerd (LD).
 Er zijn slechts 2 bevestigde waarnemingen van Texel.
Roodkopklauwier: van 6-6 t/m 9-6 1 adult ♂ Reddingboothuisje (FM&J.Mulder en later vele anderen).



Grauwe klauwier: trek vond vooral plaats rond de 10^e juni, tussen 31-5 en 27-6 tenm. 8 exx. (div. wrns); e.e.a. resulteert in tenm. 1 broedgeval. Leuke broedgevallen worden overigens in de volgende Skor behandeld: een seizoensoverzicht.
Flauwborst: 1 zingend ex. van de roodgesterde vorm op 10-6 nabij de vuurtoren (FM ea).
Tuinfluiter: op 18 en 19-6 op 2 plaatsen zang in W'duin/El.vall daarvoor en daarna niet meer: trek? (LD).
Paardgrasmus: 31-5 1 ex. nabij de Slufterkeet in de Zanddijk (E.v.d.Spek). Later werd het diertje niet meer ontdekt. Dit is het tweede geval voor Texel.
Roodmus: 2-6 1 ad. ♂ zingend bij het Corlogsschip, de Muy; ook op 3-6 nog aldaar aanwezig (o.a. Richard Witte, FM, EB en AD).
Keep: 4-6 1 ♂ of onvolwassen ♂ Corlogsschip, de Muy (FM).
Rose spreeuw: 4-6 1 ad. ex. 't Noorden (med. J.Dijkshoorn), op 5-6 zien AD&SD het ex. en later FM, waarna in volgende dagen tientallen vogelaars het dier aanschouwen. Op 20-6 zien AD&SD het dier weer. Het zou zelfs op 12-7 nog aanwezig geweest zijn (J.Dijkshoorn via FM). Tot nu toe waren er slechts twee niet beoordeelde waarnemingen van Texel bekend!



Wielewaal: 6-6 1 ex. Reddingboothuisje (K.Eigenhuis) en 10-6 1 ex. de Muy (FM).

Afkortingen zijn: EB=Egge Boerma, AD, LD&SD= Adriaan, Lieuwe en Sytske Dijkse, FM= Frits-Jan Maas en CR= Cees Roselaar.

Adriaan.

BIBLIOTHEEK.

1. De Steenloper, VWG-Den Helder, juni 1984.
 2. Vogeltrek over de Oostereng- najaar 1983.
 3. Mens en Vogel, jan/feb/mrt 1984.
 4. Vogels, Ecologie & Ontwikkeling-Jubileumnummer Stichting Mondiaal Alternatief.
 5. Het Vogeljaar- april 1984.
 6. De Gierzwaluw- KNNV/VWG Amsterdam, jrg. 22 nr. 2.
 7. Verslag van de simultaantellingen van zichtbare landtrek in het voorjaar en het najaar van 1982 in Nederland- LWVT Arnhem, juni 1984.
-

BESTUUR.

Penningmeester: Hans Witte, Warmoesstraat 69, 1791 CP Den Burg.
Rabo-nr. 362569495 t.n.v. VWG-Texel en bovenstaand adres.
Postgiro 87548 t.n.v. Rabo-Den Burg en bovenstaande gegevens.
Redactie: Marcel Groenendaal, De Ruyterstraat 130, 1794 AP
Oudeschild (02220-4182) en Gerard Nieuwland, Zeebries 6,
1791 HL Den Burg (02220-4405).
Voorzitter: Dick Schermer, Molendwarsstraat 2, 1791 DN Den
Burg (02220-4239).
Waarnemingssecretaris: Adriaan Dijkse, Duinroosstraat 20,
1796 BJ De Koog (02228-676).

PLAATJES & COPY.

De tekeningen voor dit nummer werden gemaakt door
Frits-Jan Maas, pag. 1, 13, 14 en 15,
Dick Schermer, pag. 5, 6, 7 en 8.

Copy graag voor 1 oktober naar Gerard Nieuwland, die ook het
typewerk voor het volgende nummer zal doen; waarnemingen naar
Adriaan voor 25 september.

Voor volgend jaar zoeken we een nieuwe redacteur voor wat
betreft het type-gedeelte; ik zou het na 3 jaargangen nu graag
eens overdragen. Wie wil? Inlichtingen bij mij (02220-4182),
Marcel.
