




de skor

v.w.g. texel 1983 no. 5

DE SKOR, orgaan van de VWG- Texel.

2^e jaargang nr. 5
oktober 1983

INHOUD

-Programma	1
-Zeetrek telling	2
-Bibliotheek	5
-De broedvogels van Den Burg in 1983	6
-De broedvogels van De Koog in 1983	13
-Hoogwatertelling van 16-1-1983	14
-Waarnemingenrubriek	17

PROGRAMMA.

Vrijdag 14 okt.: lezing in de Oude Ulo om 20.00 u. over de ooievaars door Luc de Bruyn.

Maandagavond 24 okt.: nachtextexcursie naar de vuurtoren om er de trek te bekijken. Start 21.00 u. voor de Aankoopcentrale, Den Burg. Daar regelen we het autovervoer.

Vrijdag 25 nov.: lezing in de Oude Ulo om 20.00 u. over het voedselzoekgedrag van de wulp op het Friese wad, door Bruno Ens.

Zaterdag 26 nov.: wadvogelexcursie bij de Cocksdorp; start om 10.00 u. bij het nieuwe Lancastermonument.

Zaterdag 31 dec.: wandeling over de Slufter; start om 10.00 u. bij het vogelwachtershuisje.

Vrijdag 20 jan.: jaarvergadering in de Oude Ulo met nog iets onbekends(???).

Tenslotte nog alvast drie data van internationale wadvogeltellingen in 1984.

Zondag 22 januari

Zondag 18 maart

Zondag 14 oktober

Nadere informatie hierover volgt uiteraard t.z.t. nog.

ZEETREKTELLEN OP TEXEL.

Voor al de eerste twee weken van september waren voor de zeetrek bijzonder boeiend. Door een aantal kort opeenvolgende depressies verschenen van een aantal echte zeevogels opmerkelijke aantallen voor de Texelse kust. Helaas vielen de beste dagen net buiten het weekend, zodat slechts een enkeling ervan kon genieten (gelukkig was dit ondergetekende). Hopelijk valt er straks in oktober ook nog wat te beleven; in principe geldt dat het tot half november bij noordwesterstormen nog bijzonder goed kan zijn. Hou het weerbericht dus een beetje in de gaten. Richard Witte, Louis Witte, Martin Poot en ondergetekende telden 64 uur bij elkaar, terwijl ook nog enkele mensen zich onregelmatig aan het Westerslag vertoonden, waarvan zeker Marcel Groenendaal niet vergeten mag worden

OVERZICHT 29 JULI- 30 SEPTEMBER.

Duikers en futen.

De eerste roodkeelduiker vloog op 8-9 langs naar noord, terwijl op 25-9 één parelduiker eveneens naar noord passeerde. Verder werden slechts enkele duikers gezien.

Op 10 augustus verscheen weer de eerste fuut op de Noordzee, daarna pas gevolgd door 2 exx. Z op 26-8. Na de derde week van september trokken wat regelmatig futen langs (tot 5 in een uur). Roodhalsfuten werden gezien op: 23-8 1 Z, 20-9 1 Z en 22-9 1 Z en 2 N. Eén kuifduiker-waarneming: 22-9 1 Z.


Stormvogels.

Deze groep vogels is de crème de la crème voor elke zeetrek-telling, en dit jaar was uitzonderlijk goed voor de noordse stormvogel, terwijl ook de noordse pijlstormvogel regelmatig gezien werd dan in andere jaren het geval was.

Voordat de grote massa noordse stormvogels passeerde, werd deze soort op 6-9 (1) en 7-9 (3) waargenomen. In de middaguren van 12-9 begon een omvangrijke verplaatsing van noordse stormvogels met 716 exx. N in 4½ uur. Dit leek erg veel, maar de ochtend daarop waren de aantallen nog hoger: 1231 N in 2 uur, terwijl 's middags nog een restantje van 100 N langskwam. Tot slot op 14-9 vlogen nog 9 noordse stormvogels N en 1 Z; nadien is de soort niet meer gezien.

De grauwe pijlstormvogel is slechts op twee dagen gezien: op 6-9 10 Z en op 13-9 1 Z.

Daarentegen vloog de noordse pijlstormvogel veel regelmatig langs: 6-9 1 Z, 12-9 3 N, 13-9 1 N, 20-9 3 Z en 1 N en 22-9 1 Z. Vaal stormvogeltje: 12-9 2 Z en 13-9 4 N.



Jan van gent en aalscholver.

In augustus werd de jan van gent in zeer kleine aantallen gezien, in de loop van september liepen de aantallen iets op: 13-9 60 N in 3 uur en 30-9 59 Z in 3 uur.

Aalscholver: 18-8 5 Z, 25-9 1 N, 30-9 1 N.

Eenden en ganzen.

Bij de zwem- en duikeenden geen trekbewegingen van enige betekenis. De wintertaling kwam nog tot 21 N en 5 Z op 8-8. Op 21-8 werden zowel de eerste smient als de eerste pijlstaarten (2) gezien. Een toppereend werd al op 30-7 gezien, daarna volgden pas weer waarnemingen eind september: 25-9 1 Z en 5 N en 30-9 5 Z. De eerste brilduiker, drie mannetjes in dit geval, vlogen naar noord op 30-9. Zelden werden meer dan 10 eiders in een uur genoteerd, zodat we over deze soort kort kunnen zijn. Eind september pas vlogen de meeste zwarte zeeëenden langs, voor die tijd zelden uren met meer dan 100 exx.: 25-9 377 Z en 257 N in 2 uur. Grote zeeëenden werden waargenomen op drie dagen in augustus (3 exx.) en op vier dagen in september (betreffende 16 exx.)

Op 25-9 vlogen de eerste middelste zaagbekken langs (8 Z), eenzelfde aantal werd gezien op 30-9: 1 Z en 7 N. Op 30-9 ook weer de eerste rotganzen: 3 Z en 4 N. In september vlogen af en toe groepjes bergeenden langs, met op 22-9 32 Z in 3 uur.

Jagers.

Ook van de grote jager werden uitzonderlijk veel exemplaren waargenomen: 4-9 2 Z, 6-9 4 Z, 10-9 1 Z, 12-9 3 Z, 13-9 13 N en 1 tp., 19-9 2 Z, 22-9 1 Z.

Middelste jager: 13-9 1 N.

De eerste waarneming van een kleine jager viel op 29-7 (1 N), daarna vloog de soort af en toe langs; in september namen de aantallen iets toe met als beste dagen 6-9 (10 Z) en 12-9 (5 N en 8 Z).

Meeuwen.

Al weer vrij vroeg waren grote aantallen grote mantelmeeuwen aanwezig; meestal vloog deze soort maar wat heen en weer achter kotters. De doortrek van kleine mantelmeeuwen was in tegenstelling tot vorig jaar nu zeer gering. Op slechts twee dagen vond enige doortrek van kokmeeuwen plaats: 18-8 109 Z (39 1^e jaars en 51 adult) en 20-9 194 Z (9 1^e jaars en 185 adult).

Dwergmeeuw: 10-9 1 adult Z en 20-9 1 1^e jaars Z.

Op 12 en 13 september trokken alweer flink wat drieteenmeeuwen langs, daarvoor werden op 29-7 en op 4-8 beide keren 2 1^e jaars vogels gezien; 12-9 28 N (16 1^e jrs en 12 ad.) en 13-9 58 N (24 1^e jrs e. 34 ad.).

Sterns.

In augustus werden maar weinig goede uren van 'noordse dieven' genoteerd (beste uur was op 27-8 met 267 Z), meestal vind juist in deze maand de sterkste doortrek plaats. Nu werden pas in de derde week van september de meeste 'dieven' waargenomen: 20-9 331 Z en 21-9 313 Z.

Voor de grote sterns was het beste uur in augustus op 21-8: 285 Z en 36 N terwijl in september op de 22^e de meeste vogels passeerden: 161 Z.

Dwergsterns werden ook al weinig gezien; in augustus bij elkaar 27 exemplaren, uit september slechts één waarneming namelijk 20-9 18 exx. in één kompakte groep zuid.

Zwarte stern: 9-8 1 Z en 1 N, 4-9 1 N, 10-9 3 Z en 22-9 2 Z.

Steltlopers.

Van vele soorten werden soms enkelingen of kleine groepjes

gezien. We beperken ons nu tot die steltlopers waarvan er meer dan 10 exemplaren in een uur waargenomen werden:

3-8 79 wulpen Z	13-9 33 bonte strandlopers Z
4-8 16 rosse grutto's tp.	30-9 28 zilverplevieren N
9-8 14 Kieviten Z	76 bonte strandlopers N
10-9 11 steenlopers Z	10 watersnippen uit zee.

Alkachtigen.

Na 12 september passeerden af en toe "alk/zeekoeten", op die dag zelf: 2 Z en 11 N (waarvan 1 zeekoet). Op 14 en 20-9: 1 alk N.

Roofvogels en uilen.

Bruine kiekendief: 30-7 1 Z.

Torenvalk: 30-9: 1 Z

Boomvalk: 26-8: 1 uit zee.

Velduil: 30-9: 1 uit zee.

Frits-Jan Maas
Rozendijk 24
1791 PE Den Burg
02220-3236

BIBLIOTHEEK.

1. De Steenloper. VWG Den Helder; mei- en sept.nummer.
2. Verslag vogelstudie 1982 mrt '83 SOVON-KNNV.
3. De Meerkoet. VWG Wieringen/Wieringermeer; jubileumnr.
4. Natuur- en milieufederatie Wierhaven; IVN/NMV/KNNV.
5. De Meerkoet; 7^e jrg. nr.2.
6. De wadden; Stichting Educareis.
7. Het Vogeljaar nr. 1,2 en 3.
8. Vogelkalender 1983.

De leesmappen lopen goed. De eerste is alweer rond, een derde is al in de maak. Ons lid, de heer Westerhuis uit De Koog heeft oude jaargangen "Vogels" en "Waddenbulletin" voor de rondzendmap gegeven. Een prima idee!

Dick.

DE BROEDVOGELS VAN DEN BURG.

Na een voorbereidend onderzoek in 1982, waarvan een verslag in Skor I-6 is verschenen werd in 1983 Den Burg door zeven VWG-ers vrij intensief geïnventariseerd op broedvogels (fig. 1). Van alle soorten wordt hier de verspreiding gegeven met kaartjes, en verder wat bijzonderheden in de tekst.

Wilde eend: (fig. 2) 7 paren.

Deze soort, waarvan de wildheid in sommige gevallen betwijfeld mag worden, vonden we in de vijver en enkele slootjes aan de rand van Den Burg.

Tafeleend: (fig. 2) 1 paar.

In de vijver; hier dezelfde twijfel!

Waterhoen: (fig. 2) 3 paren.

Ook deze soort vindt in Den Burg alleen in de vijver een geschikt biotoop.

Turkse tortel: (fig. 3) 42½ paren (!!!).

Vooraf in het centrum vrij algemeen. Opmerkelijk was een gemengd paartje turkse tortel/tortelduif langs de ijsbaan.

Houtduif: (fig. 3) 36 paren.

Aan de rand van het dorp, waar geen turkse tortels zitten.

Tortelduif: (fig. 3) 2½ paren.

Dit jaar toch nog 2 paren + 1 gemengd paartje met turkse tortel.

Huiszwaluw: (fig. 4) 14 paren.

Op oude kolonieplaatsen aan de Kogerstraat en de Schoonoord-singel.

Boerenzwaluw: (fig. 4) 7 paren.

Aan de rand van het dorp; mogelijk hebben we enkele paartjes in achterafschuurtjes over het hoofd gezien.

Gierzwaluw: (fig. 4) 4 paren.

Op de bekende kolonieplaats.

Spreeuw: (fig. 5) ca. 280 paren.

Mogelijk een onderschatting vanwege de achterafschuurtjes.

Kauw: (fig. 6) 75 paren.

Naast deze broedparen werden nog enkele groepjes niet-broeders gezien: misschien uit schoorstenen verwijderd?

Ekster: (fig. 6) 11 paren.

Alleen in de singels aan de rand van Den Burg.


Zwarte kraai: (fig. 6) 5 paren.

Alle aan de uiterste (zuid)rand van het dorp.

fig. 1:




fig. 2:




● wilde eend
x waterhoen
Δ tafeleend

fig. 3:



● turkse tortel
x houtduif
Δ tortelduif


fig. 4:



● huiszwaluw
x boerenzwaluw
Δ gierzwaluw

Heggenus: (fig. 7) 11 paren.
 Geconcentreerd in de zuid-oost hoek.
Grauwe vliegenvanger: (fig. 7) 3 paren.
Witte kwikstaart: (fig. 7) 2 paren.
Winterkoning: (fig. 8) 27 paren.
 Van de zingende mannetjes is misschien een gedeelte doortrekker geweest.
Roodborst: (fig. 8) 13 paren.
 Voor deze soort geldt hetzelfde als voor de winterkoning.
Spotvogel: (fig. 9) 15 paren.
Braamsluiper: (fig. 9) 12 paren.
 Dit jaar werden opvallend veel braamsluiers gehoord, welke waarschijnlijk voor een groot deel doortrekker zijn geweest.
Zwartkop: (fig. 9) 1 paartje.
Grasmus: (fig. 9) 1 paartje.
Pitis: (fig. 10) 22 paren.
 Vooral geconcentreerd in de bosjes bij de Slingerweg en de ijsbaan. Mogelijk waren sommige zingende mannetjes doortrekkers.
Tijftjaf: (fig. 10) 1 paartje.
Tuinfluit: (fig. 10) 1 paartje.
Merel: (fig. 11) 105 paren.
 Regelmatig verspreid; weinig paren in ongunstige gebieden zoals de sportvelden en plan Noord-West.
Zanglijster: (fig. 12) 19 paren.
 Het is moeilijk de territoria goed vast te stellen, omdat de vogels gedurende het broedseizoen relatief zwijgzaam zijn. Later in het seizoen zijn wel nesten en/of jongen gezien.
Grote lijster: (fig. 12) 1 paartje.
 Toch nog één territorium vastgesteld. Niet op de bekende plaats (tuin van Dijt) maar bij de Maricoweg.
Koolmees: (fig. 13) 83 paren.
 Vooral in Noord-West te vinden.
Pimpelmees: (fig. 13) 23 paren.
 Beduidend in aantal achterblijvend bij de koolmees.
Groenling: (fig. 14) 53 paren.
 Algemeen in het zuidelijke deel van het dorp.
Vink: (fig. 14) 8 paren.
Kneu: (fig. 15) 26 paren.
 Vooral aan de rand van Den Burg; veel bij de Slingerweg.
Putter: (fig. 15) 15 paren.
 Redelijk verspreid, maar vooral om het centrum.

fig. 5:




spreeuw;
 in gearceerde
 blokken ca. 100

fig. 6:



● kauw
 X ekster
 Δ zwarte kraai

fig. 7:




● heggenus
 X gr. vliegenvanger
 Δ witte kwikstaart

fig. 8:




● winterkoning
 X roodborst

fig. 9:




- spotvogel
- x braamsluiper
- Δ grasmus
- zwartkop

fig. 10:




- fitis
- x tuinfluiter
- Δ tjiftjaf

fig. 13:




- koolmees
- x pimpelmees

fig. 14:




- groenling
- x vink

fig. 11:




- merel

fig. 12:




- zanglijster
- x grote lijster

fig. 15:



- kneu
- x putter
- ringmus

fig. 16



- huismus;
- in gearceerde
- blokken ca 200

Ringmus: (fig. 15) 6 paren.

Hiervan 4 paren in de notaristuin. Vindt niet z'n optimale milieu.

Huismus: (fig. 16) 400-500 paren.

Waarschijnlijk veel meer, misschien wel het dubbele! De territoria zijn vrij lastig te bepalen door de grote hoeveelheid mussen, die in min of meer losse kolonies leven. Verschillende waarnemers geven in gelijksoortige gebieden andere dichtheden op.

SLOT.

Ook dit jaar zijn nog enkele stukken van Den Burg matig bekeken. Om dit nog compleet te maken en eventueel een vergelijk met dit jaar te maken lijkt het ons nuttig om volgend jaar deze inventarisatie te herhalen.

We denken er ook aan om andere dorpskernen onder de loep te nemen zoals bijvoorbeeld De Waal. We zullen dan t.z.t. een oproep voor medewerkers plaatsen.

Opvallende verschillen met het vorige jaar:

in het algemeen komen we nu tot hogere aantallen, wat voornamelijk te danken zal zijn aan het feit dat we met meer waarnemers het gebied intensiever geïnventariseerd hebben.

Nieuwe soorten zijn dit jaar tortelduif, zwarte kraai, ringmus, grote lijster, tafeleend en waterhoen, terwijl we de barmsejs missen.

Wilma Eelman
Gerard Nieuwland
Govert van Noort
Dick Schermer
Giel Witte
Hans Witte
Richard Witte

DE BROEDVOGELS VAN DE KOOG.

Vogels in De Koog? Daar lijken toch alleen maar toeristen te komen? Op drukke zomerdagen is er inderdaad niet veel aan vogelleven te zien, maar toch zijn er nog wel wat vogels. Geen belangrijke aantallen, maar voor een beter begrip van er op Texel voorkomt (en dus ook in de dorpen) hebben we dit (1983) ook in De Koog geïnventariseerd. Dit is niet zo heel intensief gebeurd. De aantallen zijn dus als minima te beschouwen. De Koog is niet rijk, zeg maar arm, aan grote tuinen of groenvoorzieningen. Het dorp ligt deels weliswaar tussen de Staatsbossen, maar deze stukken bos zijn niet meegeteld. Vandaar de vrij lage aantallen van de typische "parkvogels". De grenzen van het getelde gebied zijn: Ruyslaan, Badweg, Boodtlaan tot paadje na het jachthuis, dan in zuidelijke richting via het nieuwbouwwijkje, parkeerterrein en enkele campings naar de Kamperfoelieweg, stukje Pontweg, Epelaan, Kamerstraat en via de zuidgrens van de bebouwing van de Orchismient weer terug naar de Ruyslaan.

RESULTATEN.

(terwille van de vergelijkbaarheid heb ik de volgorde van vogeltjes maar hetzelfde gemaakt als die van het Den Burg-artikel, red.)

Scholekster: tenminste 1 paar, op een plat dak.

Turkse tortel: een schatting van tenminste 5 paar; de meest broeden in de tegenover liggende Staatsbossen; deze dieren wel vaak in het dorp te zien.

Huiszwaluw: slechts 4 nesten gevonden, vroeger toch altijd rond de 10.

Spreeuw: 29 nesten met juv. en tenminste 27 zangposten = 50

Kauw: 10 nesten plus een schatting van tenminste 10 paar =

Graspieper: 1 paar op de weilandjes voor het bejaardentehuis

Heggenmus: 3 paar.

Winterkoning: 7 paar.

Roodborst: 1 paar.

Spotvogel: 2 paar.

Braamsluiper: 2 paar.

Fitis: 6 paar.

Tuinfluiter: 1 paar.

Merel: 29 paar; ook in de kleinere tuintjes.

Zanglijster: 1 paar.
 Koolmees: 17 paar.
 Pimpelmees: 2 paar.
 Groenling: 8 paar.
 Kneus: 2 paar.
 Huismus: niet geteld.

Adriaan Dijkse
 Sytske Dijkse

RESULTATEN VAN DE WADVOGELTELLING VAN 16-1-1983.

Na drie minder geslaagde januari-tellingen in successie nu eindelijk eens een telling zonder al te grote problemen. We hebben in voorgaande jaren met nogal wat ellende te kampen gehad, getuige het volgende lijstje:

1980: winters weer tijdens en in de week voorafgaande aan de telling. Tijdens de telling matig zicht door nevel. Door oostenwind verlaging waardoor waarschijnlijk een deel van de vogels op het wad heeft overtuigt.

1981: rustig winterweer, echter met lage waterstanden waardoor mogelijk voor sommige soorten ondertelling.

1982: winters, vorst tot -8°C . In de week voorafgaand aan de telling veel sneeuwval. Een aantal soorten (waarschijnlijk scholekster o.a.) gedeeltelijk buitendijks op ijschotsen overtuigt.

1983: zacht weer en stormachtig. Verhoging, waardoor de Schorren helemaal overstroomden. Ook in de week voorafgaand aan de telling relatief hoge waterstanden. Geen vorst of sneeuw van betekenis in de weken voorafgaand aan de telling.

De weersomstandigheden op 16 januari maakten het tellen niet echt gemakkelijk (veel verspreid zittende groepjes vogels) maar zorgden er toch voor dat de telling als uitstekend geslaagd mag worden beschouwd. De gegevens geven een goed beeld van de wadvogelsaantallen in een zachte winter op Texel.

Er werden grote aantallen wulpen gezien, meer dan ooit in ari, en ook flinke aantallen kempaanen, kieviten en goudple en. Voor de laatste twee soorten zijn vooral de verschillen tussen twee tellingen onder wat meer barre omstandigheden (en 1982) en twee tellingen onder wat mildere omstandigheden (1981 en 1983) opvallend. (tabel 2). Beide soorten blijken eiland in periodes met langduriger sneeuwbedekking en vorst te verlaten. Door de hoge waterstanden tijdens en in de week afgaand aan de telling waren veel steltlopers, waaronder ook "echte" wadvogelsoorten, overgeschakeld op fourageren binnen. Op allerlei plaatsen werden groepjes bonte strandlopers gevonden in de weilanden aangetroffen. Dergelijk gedrag werd ook gezien van kanoetstrandlopers en zilverplevieren. Ook scholekster, wulp, tureluur en steenloper, waarvan ook onder normale omstandigheden 's winters een deel binnendijks fourageert, waren verhoudingsgewijs talrijk in de weilanden.

roodkeelduiker	3	tafeleend	20
parelduiker	1	kuifeend	190
dodaars	16	toppereend	5
fuut	10	eidereend	4000
kuifduiker	2	zwarte zeeëend	28
geoorde fuut	12	brilduiker	60
aalscholver	4	middelste zaagbek	30
blauwe reiger	34	waterhoen	65
lepelaar	2	meerkooit	470
knobbelswaan	7	kluut	33
wilde zwaan	1	bontbekplevier	4
rietgans	73	zilverplevier	460
kleine rietgans	10	drieteenstrandloper	390
kolgans	11	kempaan	300
grijske gans	107	watersnip	29
rotgans	5090	kleine mantelmeeuw	20
wintertaling	790	grote mantelmeeuw	600
pijlstaart	340	drieteenmeeuw	1
sloboend	150	zeekoet	6

Tabel 1. De aantallen wadvogels geteld op 16-1-1983 op Texel afgezien van de soorten, vermeld in tabel 2. (pag.

	1980	1981	1982	1983
kleine zwaan	226	219	44	280
bergeend	1900	2700	160	2400
smient	15000	11000	1300	8000
wilde eend	3500	5000	3200	3500
scholekster	12000	9000	11000	17000
goudplevier	0	2300	0	2700
kievit	0	1300	0	5600
kanoetstrandloper	3000	340	630	3600
bonte strandloper	370	1000	11	1400
rosse grutto	185	1900	1800	2200
wulp	2200	4600	4700	6100
tureluur	50	580	40	740
steenloper	33	210	17	400
kokmeeuw	1600	1400	460	1900
stormmeeuw	4100	5800	310	5000
zilvermeeuw	9100	8500	2800	6600
meeuw (niet gedet.)	200	700	400	300

Tabel 2. Aantallen wadvogels geteld op Texel tijdens de januari-tellingen van 1980 t/m 1983.

In totaal zijn er zo'n 80.000 "watervogels" geteld tijdens deze telling.

Aan de telling werd meegewerkt door: Cees Boot, Gerrit Boot, Jan Driehuis, Jet Drijver, Jan van Dijk, Adriaan Dijkse, Lieuwe Dijkse, Sytske Dijkse, Hans Kieviet, Gerard Nieuwland, Govert van Noort, Piet Ruardij, Dick Schermer, Cor Smit, Maarten Stoepker, Giel Witte, Hans Witte, Louis Witte, Marcel en Marco Witte, Lida Wels, Lida Wessels en Henk en Bart Wijsman.

Cor Smit

WAARNEMINGEN NR. 11 (AUGUSTUS/SEPTEMBER 1983).

Bijna ongemerkt zijn weer veel zomersoorten verdwenen en nu worden we weer getrakteerd op grote aantallen doortrekkers. Ik kreeg dan ook alweer lange lijsten leuke, vroege of late waarnemingen. Het is opvallend dat die steeds van dezelfde kleine "harde" kern zijn. Zien de anderen nooit iets leuks wordt het niet doorgegeven? Voor de volledigheid kreeg ik t ook die waarnemingen graag!

Sommige inzenders zullen een aantal van hun meldingen in de lijst missen. Dat zijn ten eerste de ganzen en zwanen. Die bewaar ik weer tot na het seizoen om er dan een totaal-over van te maken (dus wel blijven doorgeven). Ten tweede waarnemingen van soorten waarvan het zou kunnen dat er nog latere meldingen en binnenkomen. Genoeg gepraat, nu snel de soortenlijst.

Roodhalsfuut: weer twee aug.-waarnemingen: 10-8 1 ex. Mok (en 27-8 1 ad. zomerkleed Nieuweschild (FM&CR&H.Brugge).

Kuifduiker: 15-9 3 exx. op zee bij de Bol (H.J.Lichtenbeld)

Dodaars: 25-8 2 exx. de Schans (DS); al trek? (Waarschijnlijk "gewoon" broedvogels, red.)

Vaal stormvogeltje: 7-10 1 ex. 's morgens levend gevonden op kotter in haven Oudeschild (de nacht daarvoor kennelijk nabij Texel aan boord gevlogen), naar NRC gebracht en later aan strand losgelaten.

Kleine zilverreiger: het reeds in de vorige aflevering genoemd beest werd de hele maand augustus gezien, voornamelijk in Oudeschild. Laatste melding 4-9 Dijkmanshuizen (H.J.Lichtenbeld).

Zwarte ooievaar: 13-8 2 exx. naar ZO (E.v.d.Spek), later 2 exx. uit Ceres naar duinen en dan naar Z (CR), waarschijnlijk dezelfde dus, maar 's morgens ook een naar Z Kampeersnol (L. a.), 14-8 1 ex. opstijgend uit Bleekersvallei, dan naar Z (CR) en om 10 uur 1 ex. nabij de Slufter (Kikkert), 22-8 1 ex. bij Cocksdoorp (Hooyberg), is daar meer dagen in de buurt gezien. tenslotte 27-8 1 ex. de Muy (SBB).

Smient: 8-7 1 vrouwtje de Mok (CS); kan wijzen op broedgevepoging daatue in deze omgeving; 18-8 14 exx. (de eerste) de Mok (CS); 28-8 6 exx. Ottersaat (DS).

Buizerd: 29-7 1 ex. Westerduinen (SBB). Vroeg! Daarna pas 26-9 1 ex. de Dennen (FM).


Sperwer: 25-9 1^e waarneming: 1 ex. M.Boonsbos (RW)

Zwarte wouw: 11-8 1 ex. naar noord, Den Burg (DS).
Wespendief: 2 exx. over Mokbaai naar zuid (FM) op 31-7.
Visarend: 31-8 1 ex. naar zuid, NRC (H.Brugge) en 1 ex. naar zuid de Hors (FM); ongetwijfeld hetzelfde beest.



Smelleken: 20-5 1 mannetje Westerduinen (L.Daalder), laat!
 10-9 eerste (vr.) Kampeersnol (DS e.a.). Daarna op 14-9 een,
 op 1-10 drie en op 2-10 twee (div. waarnemers).
Roodpootvalk: 25-9 1 vrouwtje de Slufter (WE).
Kwartelkoning: 22-8 1 ex. Westerduinen (LD); de laatste waar-
 neming voor Texel dateert van 1978!
Goudplevier: 5-7 gehoord Mokbaai (Th.Merck), op 8-7 5 exx. daar
 en op 15-7 15 (CS), daarna meer.
Kleine plevier: 26-8 2 exx. Weegeswaal (DS), 1-9 1 ex. de Sluf-
 ter (LW&RW), 11-9 1 ex. Weegeswaal (DS&J.Driehuis).
Bokje: 30-8 1 ex. vijver nabij de vuurtoren en 25-9 1 ex. de
 Slufter (RW); op 28-9 1 ex. Nieuweschild en op 2-10 1 ex.
 Zuid-Haffel (MG).
Regenwulp: 21-9 1 ex. de Slufter (FM); vrij laat.
Grutto: 11-9 2 exx. polder Eyerland (CS).
Witgatje: 22-9 7 exx. Waalenburg en 25-9 1 ex. de Slufter (RW),
 1-10 2 exx. Waalenburgerdijk (DS&HW).
Boaruter: 6-8 2 exx. de Petten (FM); 25-8 1 ex. RIN (CS).
Groenpootruiter: 30-6 het eerste ex. in de Mok (CS).

Paarse strandloper: 1 ex. strand pl 14 (C.Maas) 2-10.
Kleine strandloper: 7-8 eerste ex. in Wagejot (FM&RW); in
 veel in de Slufter: 30-40 exx. Op 2-10 nog 30 aldaar. (FM).
 Enkele werden ook gezien in Weegeswaal en op de Hors.
Krombekstrandloper: laatste waarneming op 21-9, tenminste
 exx. de Slufter (FM).
Breedbekstrandloper: alweer één! 21-9 1 juv. ex. tussen bon-
 bekjes de Slufter (FM).



Grauwe franjepoot: 14-8 1 ex. de Slufter (SBB); sinds 1979
 ik geen waarnemingen meer!
Zwartkopmeeuw: van 4 t/m 11-8 1 juv. ex. (2^e winterkleed)
 't Horntje (div. waarnemers).
Reuzenstern: 14-8 1 ex. Wagejot en 1 ex. bij de Cocksdorp
 (J.Mulder en A.v.d.Berg). Sinds 1977 geen Texelse waarn.
Tortelduif: laatste waarneming 25-9 1 ex. Rozendijk. (FM).
Koekoek: laatste waarneming 22-9 1 ex. de Dennen (FM).
IJsvogel: 25-9 1 ex. Waalenburgerdijk (RW); sinds 1980 geen
 Texelse waarnemingen meer bekend.
Bijeneter: mag die hier ontbreken? Dan maar in het leuke-
 vogeloverzicht, want dat komt toch nog? (zie vorige Skor)
Draaihals: 24-8 1 ex. Bollekamer (J.Witte) en 30-8 1 ex. na
 de vuurtoren (LW&RW&FM).
Grote pieper: 2-10 1 ex. de Slufter (exc. CNV).

Grote gele kwikstaart: 1-9 1 ex. Tureluurweg (RW) en 1-10 1 ex. Vuurtorenweg (exc. CNV).

Grauwe klauwier: 24-8, 30-8, 13-9 en 14-9 steeds 1 ex. (FM&LW&RW&H.J.Lichtenbeld) Eyerlandse duinen.

Kramsvogel: al vanaf eind juli waren diverse exx. aanwezig, ook de hele maand augustus vele waarnemingen.

Zanglijster: de eerste waarneming die op mogelijke trek kan duiden was op 26-8 1 ex. de Nederlanden. (AD&SD).

Beflijster: 1-10 1 ex. de Muy en 2-10 2 exx. vuurtoren (CNV).

Paapje: 7-8 eerste doortrekker bij Westerslag (FM); vroeg.

Fluiter: 30-8 1 ex. nabij de Koog (SD). Op najaarstrek wordt deze soort bijna niet gezien.

Vuurgoudhaantje: 7-9 1 ex. Gortersmient (H.J.Lichtenbeld), 24-9 2 exx. de Slufter (FM).

Bonte vliegenvanger: eerste weer op 18-8 Pontweg (AD), 20-8 1 ex. Oudeschild (MG), na 24-8 meer waarnemingen.

Kleine vliegenvanger: 6-9 1 ex. Eyerlandse duinen (H.J.Lichtenbeld).

Buidelmees: 1 en 2-10 1 ex. de Geul (exc. CNV). Nieuwe soort voor Texel!

Zwartkopgors: 10-9 1 mannetje bij de Robbenjager; zeer mak dus waarschijnlijk geen echt wild ex. (mevr. Zegers).

IJsgors: 1-10 1 ex. paal 15 en 2-10 2 exx. de Slufter (exc. CNV).

Sneeuwgorst: 13-9 1 mannetje en 2 vrouwtjes dijkje bij de vuurtoren (H.J.Lichtenbeld). Een heel vroege waarneming; uit het verleden zijn waarnemingen bekend van 10 en 11-9.

Kruisbek: in aug. werden weer (of nog) troepjes gezien: 27-8 17 en 22 ex. nabij de Kampeersnol (DS&HW).

De gebruikte afkortingen zijn weer AD, LD, SD= Adriaan, Lieve en Sytske Dijksen, WE= Wilma Eelman, FM= Frits-Jan Maas, CR= Gees Roselaar, CS= Cor Smit, DS= Dick Schermer, LW, HW en RW= Louis, Hans en Richard Witte, CNV= Club van Nederlandse Vogelkundigen, SBB= Staatsbosbeheer; MG= red.

Copy voor deze waarnemingenrubriek graag weer voor eind nov. bij Adriaan, zodat ik voor pakjesavond deze en overige copy binnen heb. Voor adressen van bestuursleden moeten belangstellenden voor deze keer maar een vorige Skor uit hun archief lichten. Frits-Jan tekende alle vogelplaatjes van deze Skor.

Marcel.



v.w.g. texel

LIDMAATSCHAPSKAART 1983