

Ornithologisch jaarverslag Texel 1997



EEN UITGAVE VAN
Staatsbosbeheer Texel
Texel Birdwatching Center
en de Vogelwerkgroep Texel



Ornithologisch jaarverslag Texel 1997

Een uitgave van Staatsbosbeheer Texel,
Texel Birdwatching Center en de Vogelwerkgroep Texel

Eindredactie Arend Wassink

Redactie Adriaan Dijkse
Arend Wassink
Marco Witte

Diagrammen Adriaan Dijkse

Layout & opmaak (DTP) René van Rossum

Drukwerk

Kosten f 10,- (excl. verzendkosten)

Verkoopadressen Ecomare, Ruyslaan 92, 1796 AZ De Koog
Texel Birdwatching Center,
Vuurtorenweg 94, 1795 LM De Cocksdorp
Secretariaat Vogelwerkgroep Texel,
Hoefslag 5, 1791 SB Den Burg

Inhoud	Inleiding	1
	Systematische lijst	2
	Bijlage 1: Overzicht van de ontwikkeling van de broedvogel- populatie van een aantal soorten	24
	Bijlage 2: Resultaten activiteiten Ringgroep Korverskooi	31
	Bijlage 3: Resultaten SOVON wadvogeltellingen	34

Tekening omslag Spaanse Mus Sytse Dijkse

Al vele jaren worden gegevens over het voorkomen van vogels op Texel verzameld. Dit heeft geleid tot een reeks publicaties, waarvan de meest recente en volledige 'Vogels van het Gouwe Boltje' (Dijkse 1996) is. Het aantal waarnemingsgegevens is sinds 1996 sterk gestegen door de activiteiten van het Texel Birdwatching Center (TBWC). Hierdoor ontstond het idee om met gebruik van deze gegevens jaarlijks een verslag samen te stellen om zodoende meer vorm en inhoud te geven aan de resultaten van een aantal ornithologische activiteiten, die op Texel plaatsvinden. Dit idee werd voorgelegd aan het bestuur van de Vogelwerkgroep Texel die, tijdens de algemene jaarvergadering van 27 februari 1998, besloot medewerking te zullen verlenen. Later zegde ook Staatsbosbeheer Texel toe het totstandkomen van een jaarverslag te zullen steunen. Het zo ontstane, eerste verslag is gebaseerd op circa 8000 gegevens, afkomstig van algemene veldwaarnemingen uit het logboek van het TBWC en het archief van Adriaan Dijkse, resultaten van broedvogelinventarisaties in terreinen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, SOVON wadvogeltellingen en de ringgegevens van de Ringgroep Konverskooi. Van de soorten waarvan het aantal broedparen in 1997 niet bekend is, zijn de meest recente gegevens verwerkt. In bijlage 1 geeft een aantal staafdiagrammen de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie van achttien soorten over een reeks jaren weer. Waar dit nuttig geacht werd, is een aantal data van het ringwerk en de wadvogeltellingen opgenomen in de soortteksten. De integrale data zijn in respectievelijk bijlage 2 en 3 weergegeven.

De soortenlijst volgt de beslissingen van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Waarnemingen van soorten die beoordeeld worden door het CDNA zijn voorzien van een asterisk (*). Niet aanvaarde en niet ter beoordeling voorgelegde waarnemingen zijn niet in het verslag opgenomen.

In 1997 werden 252 soorten waargenomen. Uitstekende broedresultaten werden bereikt door Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Staartmee en Boomkruiper. Eindelijk vestigde de Havik zich als broedvogel en had de eerste nestvondst van de Vuurgoudhaan plaats. Wellicht was het nestbouwende mannetje Buidelmees de voorbode van de vestiging van nog een nieuwe broedvogel. Daarentegen kwam de Fluiter dit jaar niet tot broeden.

Nog nooit werden zoveel Toppers, IJseenden, Middelste Zaagbekken en Rouwkwikstaarten vastgesteld. Meer dan gemiddelde aantallen werden gezien van Morinelplevier, Grauwe Franjepoot, Vorkstaartmeeuw, Kleine Alk en Strandleeuwerik. Daar tegenover staat het totaal ontbreken van waarnemingen van Zwarte Ooievaar, IJsvogel en Sperwergrasmus. Opmerkelijk was ook dat geen enkele voorjaarswaarneming van Geelgors en Ortolaan bekend werd.

Van de zeldzame(re) vogels kunnen genoemd worden: Vale Pijlstormvogel (tweede geval), Zwarte Ibis (vierde geval), Steenuil (vijfde geval), Westelijke Bergfluiter (vierde geval) en Dwerggors (eerste voorjaars geval). De Grijze Strandloper, Orpheusspotvogel* en Spaanse Mus konden als nieuwe soorten aan de Texelse lijst worden toegevoegd. De waarneming van de Spaanse Mus betrof zelfs het eerste geval voor Nederland.

Knobbelzwaan *Cygnus olor*

Broedgevallet: 3

Het hele jaar aanwezig, zelfs bij zeer strenge vorst, zoals op 12 januari 2 in de Prins Hendrikpolder. Gezien het aantal broedparen moeten de 21 die tijdens de hoogwatertelling van 27 juli zijn gezien gedeeltelijk overzomeraars zijn geweest. Op 8 juni vloegen er 2 naar noord bij de vuurtoren.

Kleine Zwaan *Cygnus bewickii*

Tussen 1 januari en 9 februari werden er maximaal 203 (8 februari) gezien. De laatste 41 werden in de Prins Hendrikpolder waargenomen. Op 14 oktober waren de eerste 2 op de IJssel aanwezig. Het hoogste aantal betrof 634 op 14 december.

Wilde Zwaan *Cygnus cygnus*

Op 4 januari 25 zuidwest over Den Burg. Tussen 10 januari en 15 februari werden in totaal 9 vogels gezien bij Dijkmanhuizen en in het Hoornder Nieuwland. Op 10 maart vloog er nog een over het Hoornder Nieuwland. Pas op 14 december werd weer een vogel gezien in polder Het Noorden.

Taigarietgans *Anser fabalis*

De enige waarneming betrof die van 4 in een groep Toendrarietganzen tussen 18 en 21 januari in polder Het Noorden.

Toendrarietgans *Anser semirostris*

Maximaal 3200 werden geteld op 6 februari. De laatste waarneming werd op 12 februari gedaan. Op 28 oktober verschenen de eerste 28 in Eierland, wat vroeg is. Daarna werd een maximum van 2642 vastgesteld op 14 december.

Kleine Rietgans *Anser brachyrhynchos*

Telkens 2 vogels werden gezien t/m 7 februari rond Den Hoorn, in Waalenburg en Eierland. Op 6 oktober werden 2 vroege vogels gezien in polder Eierland. Hoge aan-

tallen daarna zijn 90 op 14 december in polder Het Noorden en 20 op 16 november in de Slufter.

Grauwe Gans *Anser a. anser*

Broedgevallet: ten minste 132

Het gehele jaar door aanwezig. Tijdens tellingen werden de volgende aantallen vastgesteld: 23 februari 530; 27 juli 345; 14 december 1131. Dat niet alle vogels die hier in de winter verblijven lokale vogels zijn, blijkt uit het feit dat er vogels met blauwe halsbanden, die afkomstig waren uit Scandinavië.

Kolgans *Anser a. albifrons*

Maximaal 610 op 23 februari. De laatste waarneming werd op 15 maart gedaan. De eerste herfstwaarneming was op 16 oktober met 24 in Waalenburg. Daarna werd een maximum van 713 vastgesteld op 14 december.

Brandgans *Branta leucopsis*

Op 9 februari werd een maximum van 17 waargenomen. De laatste waarneming vond plaats op 14 maart. Op 16 oktober de eerste 4 bij de Petten en maximaal 15 werden gezien op 29 november west vliegend over 't Horntje. Waarnemingen in de tussenliggende periode betreft zeer waarschijnlijk uit gevangenschap ontsnapte vogels.

Roodhalsgans *Branta ruficollis*

Op 5 mei 1 adult Dijkmanhuizen en vermoedelijk dezelfde vogel weer op 28 en 29 mei bij de Schans.

Witthukrotgans *Branta hrota*

Maximaal 30 werden t/m eind maart gezien. Van april t/m 28 mei maximaal 5. Op 5 oktober 2 in het Wagejot. Vanaf 19 oktober waren maximaal 3 vogels aanwezig. Dit is de vroegste najaarswaarneming voor Tessel. Doorgaans verschijnt de soort niet voor half oktober.

Rotgans *Branta bernicla*

Tot en met eind mei werden circa 10.000 vogels, voornamelijk op Zeeburg, waargenomen. Op 8 juni bevonden zich daar nog slechts 4 exemplaren. Dit zijn vermoedelijk de vogels geweest, die gedurende de gehele zomer werden waargenomen. Vanaf 22 september was de soort weer aanwezig. Het hoogste najaarsaantal betrof 10.123 op 16 november.

Zwarte Rotgans *Branta nigricans*

Tussen 1 januari en 18 mei maximaal 3 adulte vogels. Vanaf 18 oktober t/m december weer 2 adulte exemplaren.

Bergeend *Tadorna tadorna*

Broedgevalle: 206 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. Het hoogste aantal betrof 683 op 23 februari. In de Mokbaai werden er op 11 mei 478 geteld. Er werden opvallend veel jongen gezien met rond half juli ten minste 220 langs de oostkust, in de duinmeren en de Slufter.

Tafeleend *Aythya ferina*

Broedgevalle: 26. Het hoogste aantal ooit. Het gehele jaar door aanwezig. Maximaal 60 op 12 januari.

Kuifeend *Aythya fuligula*

Broedgevalle: 192 in 1987. In 1997 60 in de reservaten van Natuurmonumenten. Het gehele jaar door aanwezig. Maximaal 179 op 23 februari. Gezien het aantal broedgevalle moet het werkelijke maximum veel hoger liggen.

Topper *Aythya marila*

Tijdens de strenge vorstperiode gedurende de eerste helft van januari werden er 12.780 geteld in het Eierlandse Gat en omgeving. Nog nooit werden er zoveel vastgesteld. In februari nam het aantal af tot enkele honderden. De laatste voorjaarswaarneming was die van een mannetje van 13-22 april bij de IJzeren Kaap. Minimaal 2 overzomersaans werden waargenomen tussen 20 mei en 27 juli aan de oostzijde van het eiland en in de Mokbaai. Vanaf 3 september weer

aanwezig met een maximum van 26 op de Waddenzee tussen Oudeschild en Oosterend op 22 oktober.

Eider *Somateria mollissima*

Broedgevalle: 180, waarvan 1 op hollenperceel in polder de Eendracht. Het gehele jaar worden grote aantallen, ook niet-broedvogels, gezien. Maximaal werden er 4448 geteld op 16 november.

Zwarte Zee-eend *Melanitta nigra*

Het gehele jaar waargenomen. Het hoogste aantal werd vastgesteld in maart en april, toen duizenden vogels zich dicht onder de kust op de Noordzee bevonden. Gedurende het gehele jaar worden op de Waddenzee enkelingen of kleine groepjes gezien.

Grote Zee-eend *Melanitta fusca*

Gedurende de strenge vorstperiode in januari werden er tientallen waargenomen, zoals op 12 januari 25 in de omgeving van de Hors. Trek werd vastgesteld t/m 24 april (6 noord bij Eierlandse dam). In het najaar weer vanaf 28 september aanwezig. Verder geen aantalschattingen bekend.

Ijzeend *Clangula hyemalis*

Tussen 1 en 12 januari verbleven er minimaal 200 in het Eierlandse Gat en omgeving. Dit is het hoogste aantal ooit op Texel vastgesteld. Op 26 februari en 13 maart werd er 1 waargenomen op de Waddenzee.

Nonnetje *Meergellus albellus*

Hoogste aantal 12 op 8 februari op de Horsmoortjes. Dit is tevens de grootste groep die ooit op het eiland werd gezien. Laatste waarneming betrof een vrouwtje op 16 maart op de blof. Uit het najaar zijn geen waarnemingen bekend.

Brilduiker *Bucephala clangula*

Hoge aantallen tijdens de vorstperiode in januari in het Eierlandse Gat en omgeving, met 1536 op 12 januari. Op 23 februari werden er nog 136 geteld. Na maart neemt het aantal snel af. Op 13 mei de laatste vogel in een sloot bij de golfbaan. Vanaf 19

oktober weer aanwezig met 2 bij de Bol. Hoogste najaarsaantal was 88 op 14 november.

Grote Zaagbek *Aegus merganser*

Maximaal 7 op 12 januari. Laatste waarneming betrof een mannetje in de Westerkolk op 23 februari. Van het najaar zijn geen waarnemingen bekend.

Middelste Zaagbek *Aegus serrator*

Op 13 april werd een maximum van 146 op de Waddenzee tussen Oudeschild en de Schorren geteld. Dit is het hoogste aantal dat ooit op Texel werd vastgesteld. Na half april neemt het aantal snel af. Op 18 mei laatste (vrouwje) op zee bij de Vuurtoren. Overzomeren komt jaarlijks voor, met nu ook op 6 juli een vrouwje op de Waddenzee. Vanaf eind september weer aanwezig met maximaal 73 op 16 november.

Krakeend *Mareca strepera*

Broedgevalle: 23

In januari slechts een enkeling. Op 23 februari totaal 24 en 16 maart 25 alleen al in het Pompevlak. Befalve 29 op 16 november zijn geen aantalschattingen bekend van het najaar.

Smient *Mareca penelope*

Op 12 januari werden 18250 vogels geteld. In maart snel afnemend, met slechts nog mannetjes vanaf half mei tot half augustus met een maximum van 8 op 22 juni. Vanaf half augustus toenemend, met op 6 september 200 in de Westerkolk, oplopend tot 10.325 op het gehele eiland op 16 november.

Sloebend *Anas clypeata*

Broedgevalle: 52. Dit is echter een onvolledig beeld. Het gehele jaar door aanwezig. Maximaal 193 op 16 november.

Wilde Eend *Anas platyrhynchos*

Broedgevalle: 1570 in 1987

Het gehele jaar door aanwezig. Op 16 november werd een maximum van 2838 geteld.

Pijlstaart *Anas acuta*

De twee mannetjes, die in mei en juni nog in de Mokbaai en op de Schorren werden gezien, roogen o.i. niet als broedindicatie gïnterpreteerd worden. Doortrekkend t/m eind april en vanaf 14 augustus, met op 6 september 75 in de Westerkolk. Het hoogste aantal dat werd vastgesteld is 109 op 16 november.

Zomertaling *Anas querquedula*

De eerste, een mannetje, werd gezien op 18 maart in het Wagejot, gevolgd door een mannetje in de Petten op 23 maart. Dit zijn voor Texel zeer vroege gevallen. Doorgaans worden de eerste niet voor half april gezien. Daarna werden t/m 25 mei 18-21 vogels gezien, zowel paren als solitaire mannetjes. Bovendien verbleef van 7 t/m 17 juni nog een mannetje in het Grote Vlak. Er waren verder geen aanwijzingen voor een broedgeval. De enige najaarswaarneming betrof een vogel op 30 september in de Geul.

Wintertaling *Anas crecca*

Broedgevalle: 2. Nog nooit werden er zo weinig vastgesteld.

Het gehele jaar door aanwezig. Maximaal werden er 458 geteld op 16 november. De herkomst van de mannetjes die in juni en juli op diverse plaatsen worden gezien, zoals 12 op 12 juli in Dijkmanshuizen, is onbekend.

Patrijs *Pardix perdix*

Broedgevalle: 151 paar in 1987

Alhoewel exacte gegevens ontbreken is duidelijk dat het aantal paren sindsdien aanzienlijk is gedaald.

Kwartel *Coturnix coturnix*

Broedgevalle: onbekend

Op 18 mei de eerste 2 roepend in Eierlandse duinen en bij de Roggesloot. Daarna vele tientallen roepend waargenomen t/m 14 augustus. Hoogste aantallen: 13 juni 12 Koogerveld en Konvenskooi en 29 juli 9 langs de Zanddijk. Op 14 oktober werd nog een vogel waargenomen in de omgeving van de Harenplas.

Roodkeelduiker *Gavia stellata*

Tientallen exemplaren overwinterend, voornamelijk langs Noordzeekust, Noordwaarts gerichte trek waargenomen t/m 14 april met hoogste aantal van 42 in 2 uur op 27 maart langs Westerslag. Vanaf half september weer waargenomen, met maximaal 25 op 16 oktober. Werkelijke aantallen liggen beduidend hoger. Veel ongedetermineerde duikers zullen voor een groot deel betrekking hebben gehad op deze soort. Een enkele maal worden waarnemingen op de Waddenzee en binnendijks gedaan. Dit betreft dan veelal ijselachtsters.

Parelduiker *Gavia arctica*

Noordwaarts trek over Noordzee werd waargenomen vanaf 27 maart t/m 7 mei met in totaal 14 exemplaren. Op 9 en 10 april verbleef een adult op de Muzplass. Tussen 1 en 16 oktober werd de soort weer waargenomen met in totaal 7 vogels.

Ijsduiker *Gavia immer*

Van 15 t/m 27 oktober werd regelmatig een eerste-winter vogel waargenomen op de Noordzee tussen de Slufter en het Hoornsdijslag. Dit betreft het be geval voor Texel.

Dodaars *Tachyphaps ruficollis*

Broedgevallen: 14

Tijdens strenge vorst slechts een enkel ex. afwezig. Voorjaartrek t/m 20 april en vanaf 27 juli weer niet-broedvogels aanwezig.

Fuut *Podiceps cristatus*

Broedgevallen: minimaal 28 (onvolledige inventarisatie) Overwinterend met >100. Doortrek t/m 30 april en vanaf eind juni weer niet-broedvogels aanwezig.

Roodhalsfuut *Podiceps grisegena*

Overwinterend, met een maximum van 3 op 12 januari op de Waddenzee. Voorjaartrek t/m 4 mei met maximaal 2 op 6 april bij de IJzeren Kaap. Op 28 mei werden op deze locatie 2 vogels in zomerkleed waargenomen. Vanaf 27 juni t/m 16 november weer aanwezig, met maximaal 5 op 4 oktober op de Waddenzee.

Kuifduiker *Podiceps auritus*

Maximaal 2 overwinterend. Voorjaartrek t/m 30 april, met maximaal 16 op 13 april. In het najaar weer vanaf 30 september met maximaal 12 op 3 oktober op de Waddenzee.

Geoorde Fuut *Podiceps nigricollis*

Tijdens strenge vorstperiode geen waarnemingen. Voorjaartrek tussen 1 maart en 30 april, met maximaal 19 op 27 maart. Op 8 juni werd de eerste overzomeraar op de Waddenzee gezien. In juli aantal seel toenemend, met een maximum van 145 vogels op 27 juli. Op 16 november nog 26 bij IJzeren Kaap en in december nog enkele aanwezig.

Noordse Stormvogel *Fulmarus glacialis*

Getuigenis het gehele jaar waargenomen. Lichter, tijdens de winter hoofdzakelijk als strandvondst. Grote aantallen vanaf oktober met grootste aantal van 2500 naar noord in 4,5 uur bij Westerslag. Op 27 december 2 exemplaren langsvliegend over zee bij De Koog.

Grauwe Pijlstormvogel *Puffinus griseus*

Op 27 juli twee zuid over zee bij Westerslag. Daarna weer van 1 t/m 25 oktober, met minimaal 100 exemplaren. Topdagen waren 1 t/m 3 oktober, met vele 10-tallen en 25 oktober 25 ex.. Vrijwel alle waarnemingen werden gedaan op de Noordzee. Een enkele maal werd een vogel uit de Waddenzee via het Eerlandse Gat naar de Noordzee vliegend waargenomen.

Noordse Pijlstormvogel *Puffinus puffinus*

Op 6 april 2 noord over Noordzee bij de Vuurtoren. Op 27 juli 2 zuid bij Westerslag. Vanaf 1 t/m 4 oktober in totaal 5 naar zuid over de Noordzee.

Vale Pijlstormvogel *Puffinus mauretanicus*

Op 25 augustus was een exemplaar kortstondig aanwezig en daarna zuidwaarts vliegend bij de Eerlandse dam. Dit betreft het 2e geval voor Texel.

Vaal Stormvogeltje *Oreanodroma leucorhoa*
Tussen 14 september en 25 oktober 41 zuid
over de Noordzee. Hoogste aantal was 17
op 4 oktober bij het Westerslag.

Jan-van-gent *Minus lasioptus*
Tot 27 maart een enkele maal als strand-
vondst aangetroffen. Vanaf deze datum t/m
27 oktober 1000-den over Noordzee. In
augustus en september regelmatig 100-den
dicht onder de kust toeragerend in het
Eierlandse Gat.

Aalscholver *Phalacrocorax catba sinensis*
Eerste waarneming op 21 februari 1 in de
Roggesloot. Daarna waargenomen t/m 22
december 11 Zaandamvondst. Hoogste
aantallen: 20 april 537 Noorderhaaks; 5
juni 259 De Schoren; 27 juni 281 Noor-
derhaaks.

Kuifaalscholver *Phalacrocorax aristotelis*
Op 9 maart werd een al enkele weken dode
vogel gevonden op het Noordestrand tus-
sen paal 20 en 25.

Roerdomp *Bataureus stellaris*
Broedgevallen: 1-2
Op 6 januari 1 over Ecomare; 14 januari 1
Akenbuurt; 17 januari 1 verzwakt Eierland
en op 4 februari werd 1 dood aangetroffen
nabij Den Burg. Waarschijnlijk hebben
deze waarnemingen betrekking op niet-
Texelse vogels. Op 22 maart werd de eerste
balts waargenomen. Vanaf juli werden geen
waarnemingen meer doorgegeven.

Koereiger *Bobulcus ibis*
Op 8 mei en 7 t/m 12 juni 1 adult in zomer-
kleed respectievelijk bij Den Hoorn en in
het Grote Vlak. Dit betreft het 2e geval voor
Texel.

Kleine Zilverreiger *Egretta garzetta*
Tussen 29 april en 28 september werd
regelmatig, waarschijnlijk steeds hetzelfde
exemplaar op diverse plaatsen waargeno-
men.

Blauwe Reiger *Ardea cinerea*
Broedgevallen: 9
Zelfs tijdens strenge vorst worden op Texel
exemplaren waargenomen met o.a. 6 in
Den Burg op 13 januari. Tijdens de hoog-
waterdij van 27 juli werden er 26 geteld.
Echter, het werkelijke maximum moet aan-
zienlijk hoger liggen.

Purperreiger *Ardea purpurea*
Op 27 mei werd een adult op een perceel
bouwland bij De Cocksdorp waargenomen.
Op 7 augustus verbleef een vogel bij het
Wagejot en van 8 t/m 21 september verbleef
een juveniel in sloten ter hoogte van de
IJzeren Kaap.

Onievaar *Ciconia ciconia*
Van 22 t/m 25 februari verbleef een exem-
plaar bij Oudeschild. Op 20 mei 1 rood
vliegend bij IJzeren Kaap; van 8 t/m 10 juni
1 Eierland/Slufter. De enige najaarswaarne-
ming is die van 1 overvliegend nabij de
Staatsbossen op 7 augustus.

Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus*
Op 8 juni werd een exemplaar gedurende
korte tijd bij Dijkmanshuizen gezien. Dit
betreft het 4e geval voor Texel.

Lepelaar *Platalea leucorodia*
Broedgevallen: 213 (de Geul 120, de Mui
5, de Schoren 58). Het hoogste aantal
broedparen deze eeuw!
Op 15 februari bevond de eerste vogel zich
in de Geul. Op 7 oktober werd de laatste
vogel gezien boven de Schoren en de
Mokbaai. Opmerkelijk is een eerste-zomer
vogel die op 27 april werd waargenomen in
Oftersaat.

Wespendief *Pernis ptilorhynchus*
Vanaf 13 mei t/m 7 juni 19, waarvan 9 op
31 mei. Vanaf 19 juni t/m 4 september 9.

Zwarte Wouw *Milvus migrans*
Op 9 en 26 april werd telkens 1 vogel waar-
genomen bij Oosterend.

Rode Wouw *Milvus milvus*

Vermoedelijk dezelfde adulte vogel op 30 maart bij zowel 1 Horntje als over de noordpunt. Op 27 september 1 Horsmeentjes.

Zeearend *Haliaeetus albicilla*

Op 30 september vloog een onvolwassen vogel noord over de Staatsbossen. Van 1 t/m 4 november verbleef een juveniel op de Schorren en in Waalenburg.

Bruine Kiekendief *Circus aeruginosus*

Broedgevallen: 31.

Dit is het hoogste aantal ooit.

De eerste op 9 maart in de Bollekamer. Pas op 16 april werden op de noordpunt van het eiland vogels waargenomen. Daarna doortrekkend tot ver in mei. Najaarstrekk vanaf augustus, met de laatste op 23 oktober. Op 29 december werd nog een vrouwtje gezien bij de Horsmeentjes. Winterwaarnemingen zijn uiterst schaars op het eiland.

Blauwe Kiekendief *Circus cyaneus*

Broedgevallen: 19.

Het gehele jaar waargenomen. Op 25 mei werd een tweedejaars mannetje doortrekkend richting noordoost over het wad van de Cocksdoep waargenomen. Opvallend was de aanwezigheid van een groot aantal adulte mannetjes in het najaar.

Grauwe Kiekendief *Circus pygargus*

Op 12 en 13 mei 1 onvolwassen De Geul; 22 mei 1 vrouw De Geul; 30 en 31 mei en 1 juni vlogen telkens 1 adulte vrouw/ tweede kalenderjaar man/vrouw noordoost over respectievelijk vijfde van Juchems, Eierlandse duinen en de Muy.

Havik *Accipiter gentilis*

Broedgevallen: 1 eerste voor Texel.

Het gehele jaar verspreid over het eiland waargenomen. Op 3 mei nog 1 noordoost over de Muy. De indruk bestaat dat meerdere vogels van buiten het eiland hier overwinteren.

Sperwer *Accipiter nisus*

Broedgevallen: 9

Dit is het hoogste aantal ooit.

Het gehele jaar waargenomen. Doortrekkend tot eerste week mei, met op 3 mei nog 2 noordoost over de Muy. Najaarstrekk vanaf 5 augustus tot in november. In oktober op diverse dagen tientallen doortrekkend.

Buizerd *Buteo buteo*

Broedgevallen: 6.

Dit is het hoogste aantal ooit.

Het gehele jaar door waargenomen. Doortrekkend 6 maart tot ver in mei en van augustus tot in ver in oktober.

Ruigpootbuizerd *Buteo lagopus*

Van januari tot in maart 1 in de Geul en de Bollekamer. Vanaf 21 oktober maximaal 3 in de Slufter en de Eierlandse duinen.

Visarend *Pandion haliaetus*

Van 6 april t/m 25 mei 14, vrijwel alle noordoost over duingebied. Slechts 2 najaarswaarnemingen: 4 september 1 west over De Cocksdoep en 30 september 1 zuidwest bij de vuurtoren.

Torenvalk *Falco tinnunculus*

Broedgevallen: 20.

Tot in mei trekkend waargenomen. In het najaar werden weer vanaf augustus trekbewegingen geconstateerd.

Roodpootvalk *Falco tinnunculus*

Op 3 mei verbleef een vrouwtje boven de Staatsbossen; 16 mei 1 vrouwtje Hanenplas; 17 mei 1 vrouwtje noordoost over Eierlandse duinen; 18 mei 1 mannetje Slufter. Van het najaar zijn 2 gegevens bekend: 22 juli 1 adult mannetje oost omgeving Den Burg; 21 september 1 uit zee Eierlandse duinen.

Smelleken *Falco columbarius* sp.

Overwinterend 5-10. Voorjaarstrekk vanaf 17 maart t/m 17 mei (23) met een piek tussen 26 april en 6 mei (10). Najaarstrekk vanaf 28 augustus t/m 21 oktober, daarna weer 5-10 overwinterend.

Boomvalk *Falco subbuteo*

Broedgevallen: 9 (waarvan 7 in Staatsbossen)

Op 8 april zou een zeer vroege waarneming gedaan zijn boven het duinpark. Daarna vanaf 21 april t/m 31 mei (3 noordoost over noodpunt) doortrekkend. Najaarstrek vanaf augustus tot in oktober. Lokale vogels werden t/m 19 oktober waargenomen bij camping Koogerstrand.

Slechtvalk *Falco peregrinus*

Overwinterend met minimaal 5. Laatste waarneming in voorjaar op 27 maart 1 adult mannetje over Eventekooij. De eerste in het najaar op 5 augustus op de Schorren hetwel een subadult vrouwtje. Tot en met december verbleven maximaal 5 vogels op het eiland.

Waterral *Rallus aquaticus*

Broedgevallens: 5 alle in zuidelijk duin-gebied.

Het gehele jaar waargenomen. Vanaf september-oktober ook op andere plaatsen waargenomen zoals de Roggesloot, de Muij en de Kreevenskooi. Nadere gegevens ontbreken.

Porseleinhoen *Porzana porzana*

Op 3 mei werd een twee-tal roepende vogel gehoord in de Hoesmeertjes.

Kwartelkoning *Crex crex*

Op 18 mei vloog een vogel vanuit de Waddenzee bij de Schorren landinwaarts en landde in een weiland; van 3-5 september verbleef een vogel in de Kreevenskooi.

Waterhoen *Gallinula chloropus*

Broedgevallens: 101 in 1987

Het gehele jaar waargenomen. Over trekbewegingen zijn geen nadere gegevens bekend.

Meerkoet *Fulica atra*

Broedgevallens: 257 in 1987

Het gehele jaar waargenomen. Over trekbewegingen zijn geen nadere gegevens bekend.

Kraanvogel *Grus grus*

Op 22 april vloog een vogel hoog noord-oost over de Witte Hoek, Eierland.

Scholekster *Haematopus ostralegus*

Broedgevallens: 3398 in 1987

Het gehele jaar waargenomen. De hoog-watertellingen (zie blz. 34) geven enigszins inzicht in het aantalsverloop. Een goed beeld van trekbewegingen ontbreekt.

Kluit *Avosetta recurvirostra*

Broedgevallens: 216

Na strenge vorst waren de eerste weer aanwezig op 14 februari in het Wagijot. Daarna kwamen de broedvogels snel binnen. Over trekbewegingen werd weinig bekend. In het najaar werden tot in december nog waarnemingen gedaan.

Kleine Plevier *Charadrius dubius*

De enige voorjaarswaarneming betreft een vogel die op 2 mei zuidwaarts over de Eierlandse duinen vloog. Tussen 13 juli en 26 september werden er minimaal 16 waargenomen, voornamelijk bij plasjes langs de dijk aan de oostkant. Dit is een ongekeerd hoog aantal voor Texel.

Bootbekplevier *Charadrius hiaticula*

Broedgevallens: 31

Ook in de winter nog aanwezig met op 6 februari 1 wad De Cocksdorp. Wanneer 'onze' vogels al jongen hebben vindt nog sterke doortrek plaats: 30 mei 65 wad De Cocksdorp en 17 juni 5 De Schorren. Dit betreft vogels van de ondersoort *Ch. hiaticula*. Vanaf eind juli weer doortrek met o.a. 40 op 27 juli. Vanaf tweede helft augustus t/m september maximaal 100 op wad De Cocksdorp. Ook van deze vogels zal het merendeel tot *C. h. hiaticula* behoord hebben. Interessant is een waarneming van een op 2 maart op de Schorren waargenomen, oranje geveride vogel, die in de voorgaande winter gemerkt is in de Theems-monding, Engeland. Verder is een op 14 juni eveneens op de Schorren waargenomen tweede kalenderjaar vogel vermeldenswaard.

Strandplevier *Charadrius alexandrinus*

Tussen 31 maart en 25 mei werden 5 vogels waargenomen. Er werden geen najaarswaarnemingen gedaan.

Morinelplevier *Charadrius morinellus*

Op 6 mei 1. Het Noorden; 8 t/m 12 mei groep van 16 Eierland; 16 mei groep van 5 Eierland; 20 september 2 zuid over vijver van Jochens, De Cocksloep.

Goudplevier *Pluvialis apricaria*

Tijdens strenge vorst in januari geheel verdwenen. Op 23 februari weer ca. 1600 en t/m eind april 1000-den aanwezig, enkel doortrekkend. Op 11 mei nog ca. 100 in de Eendracht. Op 1 juli de eerste najaarstrekkers in de Eendracht. Op 27 juli 122 tijdens hoogwater telling. Daarna snel toenemend tot vele 1000-den vanaf augustus, bijvoorbeeld 5500 op 16 november.

Zilverplevier *Pluvialis squatarola*

Het gehele jaar door aanwezig. Enige aantallen: 11 februari 100 wad De Cocksloep; 8 mei 670 de Slufter; 5 juni 140 de Schorre; 17 juni 65 de Schorre; 27 juli 205 en op 16 november 370 tijdens hoogwater tellingen.

Kievit *Varellus vanellus*

Broedgevallen: 1540 in 1987. Alhoewel exacte gegevens onthouden zal dit aantal niet meer gehaald worden.

Tijdens strenge vorst in januari afwezig. Op 23 februari 2642 tijdens hoogwater telling. Vanaf eind juni weer doortrekkend. Enkele aantallen zijn 1417 op 27 juli en 2905 op 16 november.

Kanoet *Calidris canutus*

Het gehele jaar door aanwezig. Het maximale aantal van 11.000 op 11 februari op het wad van De Cocksloep moet betrekking hebben gehad op *C. c. islandica*. In mei en augustus/september trekt ook *C. c. canutus* door. Aantalsgegevens van deze ondersoort zijn niet bekend.

Drieteenstrandloper *Calidris alba*

Mogelijk het gehele jaar door aanwezig. Het hoogste aantal in de winter is 216 op 12 januari. Doortrek tot begin juni met maxima van 710 en 505 op Noorderhaaks op respectievelijk 16 april en 27 mei. Op 14

juni bevond zich nog 1 op de Schorre. Op 18 juli waren er weer 24 op de Hore. Het hoogste aantal in het najaar betrof 444 op 19 september op de Noorderhaaks.

Kleine Strandloper *Calidris minutus*

Vanaf 20 april t/m 3 juni slechts 12 exemplaren. Tussen 13 juli en 8 oktober minimaal 60 met een maximum van 10 op 30 augustus in het Wagejot.

Temmincks Strandloper *Calidris temminckii*

Op 19 mei 6 Minkewaal; 20 mei nog 1 aldaar; 15 juli 1 adult Minkewaal.

Grijze Strandloper *Calidris pusilla*

Op 16 juli 1 adult Wagejot. Dit is een nieuw soort voor Texel.

Krombekstrandloper *Calidris ferruginea*

Tussen 25 april en 30 mei 12 met een maximum van 6 op 30 mei. Vanaf 24 juni t/m 23 oktober minimaal 110 met een maximum van 30 op 24 augustus in het Wagejot.

Paarse Strandloper *Calidris maritima*

Op 10 april werd een vogel gezien op de Eierlandse dam, De Cocksloep. Pas op 4 september werd de eerste najaarswaarneming gedaan; wederom 4 op de Eierlandse dam, hetgeen tevens het hoogste aantal is dat werd waargenomen.

Bonte Strandloper *Calidris alpina*

Het gehele jaar door aanwezig. Doortrek t/m eind mei met op 27 mei nog 55 op Noorderhaaks. Op 3 juni werd een partieel albinistische vogel in de Mokbaai waargenomen. Vanaf begin juli nemen aantallen weer toe. Op 4 augustus bevond de eerste juveniele vogel zich op het wad bij De Cocksloep. Het hoogste aantal betrof 4645 op 20 oktober op Noorderhaaks.

Kemphaan *Philomachus pugnax*

Broedgevallen: de 6 opgegeven broedgevallen in terreinen van Natuurmonumenten hebben o.k. betrekking op line doortrekkers. Zelfs bij strenge vorst nog aanwezig: 5 januari 12 in open graskuil Het Noorden. In

februari/maart maximaal 30. Vanaf april toenemend met een maximum van 250 op 14 april in Waalenburg. Laatste voorjaars-waarneming 24 mei Waalenburg. Op 8 juli de eerste bij Oostereind. Daarna een maximum van 111 op 17 juli.

Bokje *Lymnocyrtus minimus*

In voorjaar slechts 1 op 26 maart Grote Vlak. Najaarswaarnemingen: 28 september 1 omgeving Kolkengager; 29 september t/m 3 oktober maximaal 3 de Geul; 17 oktober 1 omgeving Reddingsboothuis. De Cocksdorp; 25 oktober 1 Witte Hoek; 21 november 1 Duinpark.

Watersnip *Gallinago gallinago*

Broedgevalen: de 3 opgegeven broedgevalen in terreinen van Natuurmonumenten hebben o.c. betrekking op late doortrekkers. Zelfs tijdens zeer strenge vorst nog aanwezig: 12 januari 1 noord over strand paal 12. Voorjaartrek t/m 15 april (1 op de Sterreboel). De eerste weer op 20 juli in de Westerkolk. De 63 die op 16 november werden geteld betreft slechts een klein deel van het totaal aantal aanwezige vogels. Er zijn echter geen goede aantalschattingen bekend.

Houtsnip *Scelopax rusticola*

Broedgevalen: 19 (17 in Staatsbossen, 1 Korvenkooi, 1 Krimbos). Tijdens strenge vorst veel slachtoffers: bijvoorbeeld 5 in Krimbos op 200 meter sloot op 5 januari. Op 2 maart werd de eerste halts in de Staatsbossen waargenomen. Op 24 maart werd de laatste doortrekker in de Prins-Hendrikpolder waargenomen. Vanaf 1 oktober weer doortrek, piekend tussen half oktober en begin november, met soms vele 10-tallen vogels op de noordpunt.

IJslandse Grutto *Limosa limosa islandica*

Maximaal 5 overwinterden in Mokbaai. Vanaf begin maart doortrek met 161 op 9 maart in Slufter; 30 maart 112 Wagejot; 13 april 304 tijdens totaalstelling, met groep van 186 in Westerkolk; de laatste 5 op 25 april in 't Wagejot. Op 22 juli 1 adult in Mokbaai

en een juveniel op 6 september in 't Wagejot. Op 19 september, 3 oktober en 16 november respectievelijk 15, 13 en 7 in Mokbaai (winterpopulatie!).

Grutto *Limosa limosa*

Broedgevalen: 391 in 1987. In 1997 in terreinen van Natuurmonumenten 143, hebben wijst op een stabiele stand daar. Op 14 februari de eerste weer bij Ottersaat. De laatste op 17 september in het Binnen-zwin van de Bul.

Rosse Grutto *Limosa lapponica*

Het gehele jaar aanwezig. Enkele aantallen: op 23 februari 692; 14 juni minimaal 1000 op de Schorren (doortrek of overwinterend?); 27 juli 2791; 16 november 518.

Regenwulp *Nanmenius phaeopus*

Op 8 april eerste op de Schettersweid. Doortrek t/m 3 mei, toen nog 25 in de Westerdunen werden gezien. Daarna weer vanaf 5 juni t/m september, met een maximum van 60 op 15 juli op het wad van De Cocksdorp.

Wulp *Nanmenius angusta*

Broedgevalen: 93. Het gehele jaar aanwezig. Tijdens strenge vorst op 12 januari nog 553. Op 23 februari 5898. Eerste halts op 9 maart in Westerdunen. Het hoogste 'najaarsaantal' betrof 5142 op 27 juli.

Zwarte Ruiter *Tringa erythropus*

Op 23 maart eerste in Mokbaai, daarna t/m 22 april slechts 12 met een maximum van 9 (De Schorren) op laatstgenoemde datum. Op 13 juni weer 4 op De Schorren; 3 juli 155 eveneens op De Schorren. Op 5 augustus werden er alleen al in de Slufter 386 geteld. Daarna snel afnemend, met in november nog slechts enkele in plasjes aan de oostkant.

Tureluur *Tringa totanus*

Broedgevalen: 310 in 1987; in 1997 146 in terreinen van NM. Gehele jaar aanwezig. Tijdens strenge vorst

nog 22 op 12 januari. Op 23 februari 101: 27 juli een maximum van 2948. Vogels die hier gedurende de winter verblijven betreffen alle IJslandse Tureluurs *F. t. robusta*.

Poelruiter *Tringa stagnatilis*

Op 19 augustus werd een juveniel gezien in de Mokbaai. Dit betreft het zesde geval voor Tessel.

Groenpootruiter *Tringa nebularia*

Op 11 april de eerste 7 op De Schorren. Doortrekkend t/m 17 mei met een maximum van 37 op 22 april. Op 1 juni weer 9 op De Schorren. Op 3 juli werden daar 206 en op 22 juli ca. 2500 waargenomen, daarna aantal snel afnemend. De laatste waarneming werd gedaan op 16 november.

Witgat *Tringa ochropus*

In februari/maart diverse waarnemingen. Tussen 22 april en 23 mei (1 Mokbaai) werd voorjaarsstrek vastgesteld. Op 1 juli werden er weer enkele waargenomen, daarna toenemend tot maximaal 14 op 27 juli. Op 16 november werden nog 3 vogels geteld en daarna nog een enkel rondwervend exemplaar.

Bosruiter *Tringa glareola*

Tussen 2 en 29 mei 13. Daarna van 1 juli t/m 22 augustus met een maximum van 3 op 13 augustus.

Oeverluper *Actitis hypoleucos*

Tussen 26 april en 3 juni een maximum van enkele 10-tallen in 2e en 3e week mei. Van 30 juni t/m 19 september werden enkele 100-den waargenomen.

Steenloper *Arenaria interpres*

Het gehele jaar waargenomen. Tijdens strenge vorst op 12 januari nog 21. Geen exakte gegevens bekend van voorjaar, maar zeker enkele 100-den tot laat in mei doortrekkend. Vanaf begin juli weer doortrek, met op 27 juli 315. Aantal in augustus oplopend, maar goede tellingen ontbreken.

Gauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus*

In het voorjaar 2 waarnemingen: 3 mei 1 Ottersaat, 13 juni 1 Horsmeertjes. In het najaar 8 waarnemingen van minimaal 12 vogels: 23 augustus 1 Mokbaai en 1 Zandkes; 28 augustus 1 De IJol; 3 september t/m 9 oktober met een maximum van 5 op 27 september pendelend tussen Waggejot en Zandkes; 5 september 1 wad De Cocksdorp; 17 september 1 Woegeswaal; 28 september 1 fluitenzwin; 15 t/m 20 oktober 1 De Muy. Alle waarnemingen in het najaar hadden betrekking op juveniele/eerste-winter vogels.

Rosse Franjepoot *Phalaropus fulicarius*

Op 2 oktober 1 op strand Eierlandse Gat; 12 oktober 1 richting west Eierlandse Gat; 17 t/m 19 oktober 1 (gewond) De Slufter. Ook hier betrof het steeds juveniele/eerste-winter vogels.

Middelste Jager *Stercorarius pomarinus*

Tussen 10 september en 25 oktober 11 zuid over Noordzee. Op 2 oktober 2 uit Waddenzee west in Eierlandse Gat.

Kleine Jager *Stercorarius parasiticus*

Tussen 22 maart en 22 mei 5 noord over Noordzee. Vanaf 17 augustus t/m 24 oktober minimaal 200 zuid over Noordzee.

Kleinste Jager *Stercorarius longicaudus*

Op 2 oktober werd dezelfde adult zuid over zee bij vuurtoren en paal 20 gezien. Op 4 oktober 1 adult noord over Noordzee bij Westerslag.

Grote Jager *Catharacta skua*

Van 22 februari t/m 1 maart werd een verzwakte vogel gezien bij 1 Hornje. Op 27 juli werd een vogel ter plaatse aangetroffen op De Huis. Van 8 september t/m 11 oktober werden minimaal 30 west bij Eierlandse Gat en zuid over Noordzee waargenomen.

Zwartkopmeeuw *Larus melanocephalus*

Van 7 t/m 11 februari 1 onvolwassen De Slufter; 6 maart 1 adult RWZI Eversteekooij. Vanaf 30 april t/m 28 september regelmatig

aanwezig met een maximum van 3 in juli op het wad van De Cocksdorp. De waarnemingen in deze periode hebben betrekking op zeker 10 individuen. Op 25 november werd nog een eerste-winter in Eierland waargenomen.

Dwergmeeuw *Larus minutus*

Tijdens vorstperiode geen waarnemingen. Op 28 februari 1 RWZI Eversteekooi, daarna doortrek t/m 3 mei. Tussen 11 juli en 13 december enkele 100-den, voornamelijk zuid over Noordzee.

Vorkstaartmeeuw *Larus sabini*

Passend in het landelijke beeld werden er ook op Tessel dit jaar beduidend meer waarnemingen gedaan dan gemiddeld het geval is: 13 september 1 west Eierlandse Gat; 16 september 1 achter voorhoofd Marsdiep; 1 oktober 1 zuid over Noordzee paal 28; 1 oktober 1 zuid en 1 noord; 3 oktober 2 zuid; 4 oktober 1 zuid en 13 oktober 1 zuid over Noordzee bij Westerslag. Alle waarnemingen hadden betrekking op juveniele vogels.

Kokmeeuw *Larus ridibundus*

Broedgevallen: 1577

Het gehele jaar aanwezig. Tijdens strenge vorst op 12 januari nog 889; op 23 februari 1403; 27 juli 6462; 16 november 1652.

Stormmeeuw *Larus canus*

Broedgevallen: 1574 duingebied, 1 De Petten, 1 RWZI Eversteekooi.

Het gehele jaar aanwezig. Tijdens strenge vorstperiode was het de meest algemene meeuw, met op 12 januari 3960. Hoogste aantal was 6503 op 27 juli.

Kleine Mantelmeeuw *Larus grællii fuscus*

Broedgevallen: 9326 in duingebied en 1 op De Schorren (hoogste aantal ooit). De soort is hiermee de meest algemene broedvogel op het eiland.

Op 12 januari een eerste-winter op strand bij paal 8 is de eerste waarneming. Doortrek werd vastgesteld tot in ieder geval eind mei. Op 16 november werden de laatste 11 vogels waargenomen.

Zilvermeeuw *Larus argentatus*

Broedgevallen: 8753 in duingebied en 70 op De Schorren.

Het gehele jaar aanwezig. Tijdens strenge vorst op 12 januari 1651; op 23 februari 5742; 27 juli 5184; 16 november 2761.

Grote Mantelmeeuw *Larus marinus*

Het gehele jaar aanwezig. Enkele aantallen (exclusief Noorderhaaks): 12 januari 454; 23 februari 206; 27 juli 93 en 16 november 1433. Op de Noorderhaaks werden op 27 juni 271 en 19 september 1271 geteld.

Drieteenmeeuw *Rissa tridactyla*

Het gehele jaar werden waarnemingen gedaan. Het maximale aantal bedroeg slechts 5 over Noordzee bij paal 28 op 1 oktober. Dit reflecteert slechts het feit dat van bepaalde soorten weinig waarnemingen worden doorgegeven.

Lachstern *Gelochelidon nilotica*

Op 3 mei 2 noord over Noordzee bij vuurtoren; 13 september 2 zuid over Noordzee bij De Koog.

Grote Stern *Sterna sandvicensis*

Broedgevallen: 132 in 1 kolonie op het Puntje. Dit is de eerste vestiging sinds 1991. De eerste werd op 16 maart op De Bul waargenomen. Op 11 april ca. 250 op wad De Cocksdorp; 20 april 8780 Noorderhaaks; 27 juni 370 Noorderhaaks; 27 juli 1199 Tessel; 19 september 205 Noorderhaaks. Daarna neemt aantal snel af. Na half oktober werden geen waarnemingen meer bekend.

Visdief *Sterna hirundo*

Broedgevallen: 209

Op 27 maart de eerste 3 over Noordzee bij Westerslag. De laatste op 12 oktober in het Eierlandse Gat. Op 3 en 11 juli minimaal 2 eerste-zomer vogels op wad De Cocksdorp. Vogels van deze leeftijd worden heel weinig in onze controfen aangetroffen. Er zijn geen goede aantalschattingen/trekgegevens bekend.

Noordse Stern *Sterna paradisaea*

Broedgevalle: 28 op het wad van De Cocksdorp en 1 in het Wagejot.

Op 18 april de eerste over Noordzee. Op 24 april aankomt in broedgebied (Wagejot). Op 12 oktober werd de laatste gezien in het Eierlandse Gat. Ook van deze soort zijn geen goede aantalschattingen/trekgegevens bekend.

Visdief/Noordse Stern *Sterna hirundo*
paradisaea

Op 20 april werden er 2180 geteld op de Noorderhaaks.

Dwergstern *Sterna albifrons*

Broedgevalle: tenminste 105.

De eerste op 11 april op wad De Cocksdorp; 25 juli 227; 16 september 20 en op 20 september de laatste 4 alkaar.

Zwarte Stern *Chlidonias nigra*

Dit het voorjaar zijn slechts 2 gegevens bekend geweest; 2 mei 1 en 16 mei 3 Hoersmoetjes. Vanaf 26 juli t/m 10 augustus werden er 13 waargenomen.

Witvleugelstern *Chlidonias leucoptera*

Van 21 t/m 24 mei 1 adult Muiplas. Dit betreft het 3e geval voor Texel.

Zeekoet *Uria aalge* sop

In januari en februari regelmatig op Noordzee waargenomen. Vanaf 24 augustus weer aanwezig. Slechts een fractie van de langsvliegende alk/zeekoeten kunnen op soort worden gesludetermineerd.

Alk *Alca torda*

Slechts in 4 gevallen kon met zekerheid worden vastgesteld dat het deze soort betrof: 25 februari 1 noord Eierlandse dam; 3 oktober 1 Noordzee bij Westerslag; 22 oktober 2 Noordzee paal 1B.

Zwarte Zeekoet *Cyphus gryllus**

Op 3 oktober werd een adult winterkleed vogel over en op Noordzee bij paal 20 waargenomen. Dit betreft het twaalfde geval voor Texel.

Kleine Alk *Alle alle*

Tussen 2 en 28 oktober werden er minimaal 54 langs de Noordzeekust gezien. Verder: 23 oktober 1 in weiland langs Zanddijk; 23 oktober 2 op Waddenzee bij IJzeren Kaap; 25 oktober 1 verzwakt en later dood bij Westerslag; 26 oktober 1 idem langs Noordzeekust.

Papegaaiduiker *Fratercula arctica*

Op 4 oktober 1 noord over Noordzee bij Westerslag; op 21 oktober Noordzee paal 1B.

Holenduif *Columba oenas*

Broedgevalle: 42 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. Ook in strenge winters verblijven (grote) groepen op het eiland zoals op 14 januari 50 Heidehoel.

Houtduif *Columba palumbus*

Broedgevalle: 883 in 1987

Het gehele jaar talrijk aanwezig. Opmerkelijk was dat er op 1 mei nog noordwaarts gerichte trek bij de vuurtoren werd waargenomen.

Turkse Tortel *Streptopelia decaocto*

Broedgevalle: 279 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. Eerste zang op 1 maart in Den Burg.

Zomertortel *Streptopelia turtur*

Broedgevalle: minimaal 114 (Staatshoven 25, cultuurland tenminste 44 (onvolledig) en duingebied 15 (onvolledig))

Op 27 april werd de eerste gehoord op de Hoge Berg. Doortrek t/m begin mei. Vanaf 8 augustus weer zuidwaarts gerichte trek. Op 5 oktober werd de laatste gezien bij de vijver van Jochens.

Koekoek *Corvus corax*

Broedgevalle: laatst bekende schatting is minimaal 60 in 1974.

Op 27 april werd de eerste zang gehoord in de omgeving van de Hoersmoetjes. Over doortrek in het voorjaar werd weinig bekend. Vanaf augustus weer doortrekkend. Op 14 september laatste vogel in de Geul.

Het bruine fase vrouwtje dat in ieder geval sinds 1994 jaarlijks in de omgeving van het Krimbos verblijft, was ook dit broedseizoen aanwezig.

Kerkuil *Tyto alba*

In de eerste week van januari zouden in twee schuren op Texel een vogel gezien zijn.

Steenuil *Athene noctua*

Vanaf 24 december 1996 t/m 28 januari 1997 verbleef 1 in de Westen. Op 26 april werd zeer waarschijnlijk dezelfde vogel gezien in polder Het Noorden. Dit is het vijfde geval van deze soort op Texel.

Ransuil *Asio otus*

Broedgevallet: 13 paar.

Het gehele jaar aanwezig. Vermoedelijk overwinteren vogels van elders op het eiland. De eerste hals werd waargenomen op 30 januari. In het najaar vindt ook doortrek in onbekend aantal plaats.

Velduil *Asio flammeus*

Broedgevallet: 8 paar.

Onduidelijk is of er vogels hebben overwinterd. Op 14 februari werd de eerste op de noordpunt gezien. Op 20 februari eerste hals in Bullekamer. Op 14 april 1 noord-oost over noordpunt en 17 april 1 polder Eendracht betreffen waarschijnlijk doortrekkers. Mogelijk dat de vogel die zich op 30 april op de Robbenjager bevond ook nog een doortrekker betrof. In het najaar vond doortrek tot ver in oktober plaats; 20 oktober 1 Noorderhaaks. Na 11 november (1 de Mui) zijn er geen waarnemingen meer gedaan.

Gierzwaluw *Apus apus*

Broedgevallet: 9-15 (Den Burg 5-10; De Waal 4-5).

Op 1 mei de eerste noord over Eerlandse duinen. Werkelijke migratie in het voorjaar moeilijk vast te stellen i.v.m. voedselvuchten van vogels uit de kop van Noord-Holland. Vanaf begin augustus weer zuidwaarse trek. Laatste waarneming: 30

september 1 zuid over camping de Sluftervallei.

Ijswogel *Alcedo atthis*

Vermoedelijk als gevolg van twee opeenvolgende strenge winters werd geen enkele waarneming gedaan!

Bijeneter *Merops apiaster*

Op 26 juli 1 rondvliegend De Waal.

Hop *Upupa epops*

Op 27 april 1 de Mui; 22 oktober 1 Honsmeentjes; 24-26 oktober 1 parkoorterein Westerslag.

Draaihals *Jynx torquilla*

Op 25-26 april 1 vijver van Jochems; 25 april 1 langs Vuurtuinweg, De Cockschorp; 4 mei 1 de Mui; 31 augustus 1 de Geul; 4 september 1 ringvangst Kuverskooi; 28 september 1 parkoorterein paal 28; 28 september-1 oktober 1 omgeving 'tuintjes', Eerlandse duinen; 30 september 1 camping Koogerstrand; 8 oktober 1 omgeving Kuverskooi; 9 oktober 1 Pomona; 11-21 oktober 1 ringvangst Kuverskooi.

Grote Bonte Specht *Dendrocopos major*

Broedgevallet: 16; Staathuizen, 1 Hoge Bleg.

Het gehele jaar aanwezig. De vogel die op 2 mei nog op camping de Robbenjager werd waargenomen betreft waarschijnlijk D m. major. Vanaf september arriveren er vogels van buiten het eiland, die mogelijk alle betrekking hebben op deze noordelijke ondersoort.

Boomleeuwerik *Lullula arborea*

De enige voorjaarswaarneming betreft 1 in de omgeving van de vuurtoren op 11 maart. Najaarswaarnemingen: 18 oktober 15 zuid en 2 ter plaatse noordpunt; 19 oktober 2 zuid over camping de Sluftervallei; 17 november 1 bij reddingsbootschuur; 29 november 1 volkstuintjes Den Hoorn.

Veldleeuwerik *Alauda arvensis*

Broedgevallet: 383 in 1987.

Het gehele jaar aanwezig. In de winter grote groepen in de polders, zoals meer dan 400 in de Eendracht op 2 januari. Eerste zang op 5 maart in de Honner.

Strandleeuwerik *Eremophila alpestris*

In winter ca. 170, voornamelijk in de Slufter. Op 15 maart nog 58 aldaar aanwezig. Op 12 april nog een groep van ca. 20 in de omgeving van de Reddingshoofschuur en 30 april de laatste overvliegend naar noord boven de 'tuintjes'. Eierlandse duinen. Op 28 september de eerste zuid over camping de Sluftervallei. Op 7 oktober 13 in de Slufter, oplopend tot maximaal 200 aldaar op 26 oktober. Daarna weer afnemend tot ca. 50 in december. Gedurende oktober-december werden in de omgeving van de Petten en de Makkhai nog enkele 10-tallen vogels waargenomen.

Overzwaluw *Riparia riparia*

Broedgevallet: 2 bij de Schuurs

Op 22 maart de eerste boven de vijver van Jochems. Op 31 mei nog doortrek bij de vuurtoren. Vanaf augustus weer doortrekkend t/m september. Aantallen van doortrekkende vogels ontfreken.

Boerenwaluw *Hirundo rustica*

Broedgevallet: ten minste 282 in 1987.

Op 24 maart werd de eerste waargenomen boven de Ruige Hoek. Tot en met begin juni zeker enkele 1000-den doortrekkend. In het najaar opvallend veel waargenomen in november. De laatste waarneming was die van 1 zuid over TBWC op 24 november.

Huizwaluw *Delichon urbica*

Broedgevallet: 37

Een absurd vroege waarneming is die van een vogel die enige tijd boven de vijver van Jochems vloog op 22 maart (vroegste ooit op Tessel). Pas op 29 april werden weer enkele vogels bij de Minkwaal waargenomen. Doortrekkend tot in ieder geval 31 mei, met bijvoorbeeld op 16 mei tussen 9.00 en 10.30 250 noord over Eierlandse duinen. In het najaar worden ook grotere aantallen gezien, bijvoorbeeld op 28 sep-

tember enkele 100-den nabij Oost. De laatste vogel werd op 12 november rondvliegend in de Slufter waargenomen. Dit is tevens de laatste waarneming voor Tessel.

Grote Pieper *Anthus richardi*

Tussen 27 september en 21 oktober 17, veelal overvliegend zuid, soms enige tijd ter plaatse. De meeste werden waargenomen op de noordkop.

Duinpieper *Anthus campestris*

Op 20 en 21 augustus werd beide malen 1 zuid in de omgeving van de 'tuintjes'. Eierlandse duinen waargenomen.

Boompieper *Anthus trivialis*

Broedgevallet: 5 in Staatsbossen

Op 8 april werd de eerste op de noordpunt waargenomen. Doortrekkend t/m 6 juni (3 tuin TBWC). Vanaf augustus weer doortrekkend, met de laatste op 18 oktober bij de vijver van Jochems.

Graspieper *Anthus pratensis*

Broedgevallet: 339 in 1987.

Het gehele jaar aanwezig. Over aantallen doortrekkers in voor- en najaar is weinig bekend. In winter grote groepen aanwezig in polder Eierland.

Roodkeelpieper *Anthus cervinus*

Op 29 september 1 zuid over 'tuintjes'. Eierlandse duinen.

Overpieper *Anthus petrosus*

In voorjaar t/m april aanwezig, met zeker 50 tot in maart. Op 18 september weer 1 zuid bij de vuurtoren. Op goede trekdagen kunnen er per dag 50-100 worden waargenomen.

Waterpieper *Anthus spinoletta*

Op 5 maart 1 de Bol; 10 maart 1 rondvliegend tuin TBWC; 15 maart 1 de Bol. Tussen 20 september en 24 oktober ca. 20 doortrekkend of ter plaatse, met maximaal 5 in de Slufter op 25 oktober.

Gele Kwikstaart *Motacilla flava*

Broedgevallen: 357 in 1987

Op 21 maart eerste bij de Cocksdoop. Tot en met 2 juni doortrekkend waargenomen. Vanaf begin augustus weer doortrekkend t/m 30 september met op sommige dagen vele 100-den.

Noordse Kwikstaart *Motacilla thunbergi*

De eerste op 2 mei polder Wassenaar. Doortrek t/m 2 juni met hoogste aantallen 12 op 21 mei en 16 op 1 juni. Er werden geen najaarwaarnemingen bekend.

Engelse Kwikstaart *Motacilla flavissima*

Op 27 april de eerste in polder Wassenaar. Doortrekkend t/m 22 mei met een maximum van 7 op 1 mei. Uit het najaar werden slechts 2 gegevens bekend: op 22 en 26 augustus respectievelijk 1 en 1 mannetje Minkewaai.

Grote Gele Kwikstaart *Motacilla cinerea*

Op 18 maart 1 RWZI Eversteekooij; 15 mei 1 mannetje langs vijver TBWC; 16 mei 1 ruud over De Koog. Tussen 26 september en 18 oktober 14 zuid of ter plaatse.

Witte Kwikstaart *Motacilla alba*

Broedgevallen: 234 in 1987

Op 19 februari de eerste op de Bol. Op 14 maart eerste zang Ongeret. Piek van de voorjaars trek tweede week maart - eerste week april met o.a. >100 bij gemaal Dijkmanshuizen op 22 maart, 130 op slaapplek RWZI De Cocksdoop op 30 maart en 200 op slaapplek RWZI Eversteekooij op 6 april. De laatste trek werd waargenomen op 27 april over TBWC. Over najaars trek zijn geen nadere gegevens bekend.

Rouwkwikstaart *Motacilla yarellii*

Broedgevallen: 1 Bollekamer en een gemengd paar RWZI Eversteekooij. Op 24 februari de eerste op RWZI Eversteekooij. Daarna werd ontdekt dat op slaapplek, t.w. RWZI De Cocksdoop en RWZI Eversteekooij relatief grote aantallen slapen. Tijdens een simultaan telling op 22 maart werden er 65 geteld. Bovendien werden er

op die datum 's avonds nog 10 bij gemaal Dijkmanshuizen waargenomen. De piek van de voorjaars trek viel tussen 15 en 30 maart. Op 15 mei werd de laatste doortrekker gezien langs fietspad Zanddijk. Het enige najaarsgegeven betrof 1 op 25 september langs Vuurtorenweg.

Pestvogel *Bombus agrorum*

Tussen 5 en 28 januari maximaal 2 Den Burg; 26 november 17 zuid bij gemaal De Cocksdoop en 1 zuid over camping de Robbenjager; 13 december 2 Den Burg.

Waterspreeuw *Cinclus cinclus*

Op 30 november 1 Hoornder Nieuwland. Dit betreft het tiende geval voor Texel.

Winterkoning *Troglodytes troglodytes*

Broedgevallen: 925 in 1987. In de Staatsbossen 200 in 1997. Het gehele jaar aanwezig.

Heggenmus *Prunella modularis*

Broedgevallen: 305 in 1987.

Eerste zang op 23 februari in de Muy. Over trekbewegingen in het voorjaar is niets bekend. In het najaar vanaf september-oktober op goede trekdagen >110 op noordpunt.

Roodborst *Erithacus rubecula*

Broedgevallen: 167 in 1987.

In ieder geval t/m eind april doortrekkend. Op 31 augustus weer de eerste trekker in tuin TBWC. Vanaf eind september-oktober op goede trekdagen >100 op noordpunt.

Nachtegaal *Luscinia megarhynchos*

Broedgevallen: 47 in duingebied in 1996, respectievelijk 13 en 3 in Klimbos en Staatsbossen in 1997.

Eerste zang op 17 april in de Geul. Er zijn geen goede gegevens over trek in voor- en najaar bekend.

Winterblauwborst *Luscinia svecica cyaneola*

Broedgevallen: 17 in duingebied, 3 in cultuurland. Eerste zang op 27 maart in de Geul. De

soort werd t/m 20 juli gezien; daarna werden geen gegevens meer bekend.

Roodsterblauwborst *Luscinia s. svecica*

Het vrouwtje dat op 8 juni in de 'tuintjes', Eierlandse duinen, werd waargenomen, moet vrijwel zeker betrekking hebben gehad op deze ondersoort.

Zwarte Roodstaart *Phoenicurus ochruros*

Broedgevallen: minimaal 10

Op 14 januari 1 bij Oost; op 31 januari 1 Den Hoorn. Midwinterwaarnemingen zijn zeldzaam op Texel. Vanaf 5 maart tot eind april werd doortrek waargenomen met een maximum van zeker 10 op 19 maart op noordpunt. In het najaar werd trek vastgesteld tussen 18 oktober en 11 november.

Gekraagde Roodstaart *Phoenicurus phoenicurus*

Broedgevallen: 13

Op 13 april werd de eerste waargenomen in de Staatsbossen, daarna doortrekkend t/m 1 juni. Op 9 augustus eerste najaarstrek, die t/m 24 oktober plaatsvond. Opmerkelijk was de vangst van een vogel op 10 november in de Koeverskooi.

Paap *Saxicola rubetra*

Broedgevallen: 2

Eerste waarneming op 30 april bij De Cocksdorp, daarna t/m 2 juni doortrek. Ongevoen is een waarneming op 17 juni bij Het Horntje. De najaarstrek voltrok zich van 30 juli t/m 20 oktober, met eind augustus een piek; 31 augustus alleen al 30 op noordkop.

Roodborsttapuit *Saxicola torquata*

Broedgevallen: ca. 40

Eerste waarneming op 1 maart bij Westerslag, daarna tot in april doortrekkend. Een waarneming van een juveniel en een adult mannetje op het terrein van het THWC op respectievelijk 18 en 19 juli wijst waarschijnlijk op dispersie. Najaarstrek werd vastgesteld van 22 september t/m 24 oktober.

Tapuit *Oenanthe oenanthe*

Broedgevallen: 67

Reeds op 9 maart werd de eerste vogel gezien, daarna doortrek t/m 23 mei met eind april een piek (27 april '95 op noordkop). De waarneming van een vogel op 25 juni in het Mindewaal is moeilijk te plaatsen. Vanaf begin augustus t/m 22 oktober werd najaarstrek geconstateerd. Een zeer late waarneming betrof die op 1 december in de omgeving van Den Hoorn.

Beflijster *Turdus torquatus*

Eerste op 4 april bij de Geul. Doortrek t/m 3 mei, met een piek op 27 april van 45 op de noordkop. Op 19 september werd de eerste weer gezien, daarna doortrekkend t/m 18 oktober. Nu met een piek op 27 september met 29 vogels verspreid over het eiland. Zowel in voor- als najaar werden ca. 100 vogels geteld. Dit wijkt af van het door Dijkse (1996) geschetste beeld van de aantalsverhouding in voor- en najaar van ca. 3,5:1.

Merel *Turdus merula*

Broedgevallen: 744 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. Op 14 februari werd de eerste zang gehoord. Rond 10 maart eerste trek, voortdurend t/m 27 april. Op 25 september werd de eerste najaarstrek op de noordkop geconstateerd. De eerste grote aankomst vond op 11 oktober plaats. De najaarstrek duurde voort tot ver in november.

Kramsvogel *Turdus pilaris*

Gedurende januari en februari regelmatig groepjes. Vanaf half maart enkele 1000-ders in polder Eierland. Op 30 april een groep van 125 over vijver van Jochems. Op 19 mei vlogen de laatste 2 vogels over de noordkop. Vanaf 19 augustus rindvliegende groepjes van maximaal 10 vogels. Op 23 oktober tussen 8 en 10 uur ca. 20.000 zuid over Geul. Najaarstrek duurde tot in november.

Zanglijster *Turdus philomelos*

Het gehele jaar aanwezig. Op 7 februari

eerste zang in Den Burg. Op 10 maart eerste trek, daarna op 27 april enkele 100-den op noordkop. Op 20 september eerste trek met op 27 september aankomst van 100-den vogels. Daarna doortrek tot in november.

Kuperwiek *Turdus iliacus*

Op 1 maart werd de eerste trek vastgesteld. Op 14 maart al 100-den doortrekkend met o.a. groepszang in Krimbos. Daarna doortrekkend tot ver in april. Najaarstrek vanaf 21 september. Op 11 oktober grote aankomst, daarna trekkend tot in november met een opleving tijdens een vorstperiode in december.

Grote Lijster *Turdus viscivorus*

Broedgevallert: 7

Op 8 februari eerste doortrek met t/m 25 maart hoogstens 20 vogels. Van 20 september t/m 27 oktober werd najaarstrek geconstateerd, waarbij de aantallen iets hoger lagen als in het voorjaar.

Sprinkhaanzanger *Locustella naevia*

Broedgevallert: minimaal 68 in 1987

Eerste waarneming op 27 april. Daarna tot ver in mei doortrekkend. Vanaf 20 augustus t/m 3 oktober werd najaarstrek geconstateerd.

Rietzanger *Acrocephalus schoenobaenus*

Broedgevallert: 53 in duingebied in 1990

Eerste waarneming op 26 april, daarna t/m 10 juni doortrekkend. In najaar in ieder geval tot half september doortrekkend.

Bosrietzanger *Acrocephalus palustris*

Broedgevallert: 38 in 1987

Eerste waarneming op 13 mei. Doortrekkend t/m 10 juni. Uit het najaar zijn geen gegevens bekend.

Kleine Karekiet *Acrocephalus scirpaceus*

Broedgevallert: 326 in 1987

Eerste waarneming op 30 april en doortrekkend t/m 10 juni. Najaarstrek vanaf augustus t/m 1 oktober.

Spotvogel *Hippolais icterina*

Broedgevallert: 162 in 1987

Op 12 mei werd de eerste waarneming gedaan. Doortrekkend tot in juni. Najaarstrek werd geconstateerd vanaf 21 augustus t/m 21 september.

Orpheusspotvogel *Hippolais polyglotta**

Op 26 augustus werd een eerste-winter vogel waargenomen op het terrein van het TBWC. Dit betreft, indien aanvaard, een nieuwe soort voor Texel.

Braamsluiper *Sylvia curruca*

Broedgevallert: 124 in 1987.

Op 25 april werd de eerste waarneming gedaan, daarna doortrekkend t/m 9 juni. Najaarstrek van 6 augustus t/m 20 september.

Grasmus *Sylvia communis*

Broedgevallert: 360 in 1987. In de proefgebieden van de duinen 72 in 1997.

Eerste waarneming op 25 april, daarna doortrekkend t/m 28 mei. Vanaf begin augustus t/m 23 oktober werd najaarstrek geconstateerd.

Tuinfluitert *Sylvia lincolni*

Broedgevallert: 166 in 1987. In 1997 70 in Staatsbossen en ten minste 27 in cultuurland.

Op 30 april eerste waarneming, daarna t/m 10 juni doortrekkend met een piek in de derde week van mei: 19 mei 10 op noordkop. Najaarstrek van 21 augustus t/m 21 oktober.

Zwartkop *Sylvia atricapilla*

Broedgevallert: minimaal 123 (84 in Staatsbossen, tenminste 28 in cultuurland en minimaal 11 in het duingebied).

Op 8 februari eerste waarneming, daarna doortrekkend tot in mei. Najaarstrek vanaf september, met eerste grote aankomst op 18 september en doortrekkend t/m 18 november. Enkele late gegevens zijn: 18-26 december 1 mannetje terrein TBWC; 19 december 1 vrouwtje Den Burg.

Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus*
Op 19 oktober 1 de Geul; 30 oktober 1 Den Burg; 13 november 1 omgeving reddingsbootschuur; 22 november 1 Staatsbossen.

Bladkoning *Phylloscopus inornatus*
Tussen 20 september en 10 november 16 exemplaren, waarvan 3 vangsten in de Korverskooi; op 25 en 29 september en 10 november.

Westelijke Bergfluit *Phylloscopus bonelli*
Tussen 28 september en 11 oktober werd een eerste-winter vogel gezien en zingend gehoord langs de Vuurtorenweg, De Cocksdoorp. Dit betreft het vierde geval voor Texel.

Fluiter *Phylloscopus sibilatrix*
Broedgevalleten; er werden dit jaar, evenals in 1981 en 1996 geen broedgevalleten vastgesteld.
Slechts de volgende waarnemingen werden bekend: 10 mei 1, 14 mei 3-4 en 18 mei 1 in Staatsbossen; 19 mei 1 Dorpzicht, De Cocksdoorp; 9-10 en 20 september 1 terrein TBWC; 28 september polier de Eendracht.

Tijftaf *Phylloscopus collybita*
Broedgevalleten: 177 in Staatsbossen.
Op 5 maart eerste waarneming, daarna doortrekkend t/m 31 mei. Vanaf derde week augustus weer najaartrek t/m 22 november. Op 10 september werd een roepende *Ph. collybita* gezien in de Eierlandse duinen.

Fitis *Phylloscopus trochilus*
Broedgevalleten: 972 in 1987
Op 30 maart eerste waarneming, daarna doortrekkend tot ver in mei. In het najaar weer vanaf begin augustus doortrekkend tot eind oktober. De laatste waarnemingen zijn: 19-24 oktober 1 Dorpzicht, De Cocksdoorp en 28 oktober vangst Korverskooi.

Goudhaan *Regulus regulus*
Broedgevalleten: 11
Het gehele jaar aanwezig. In het voorjaar doortrekkend t/m 30 april. In het najaar vanaf 10 september tot in november doortrekkend.

Vuurgoudhaan *Regulus ignicapillus*
Broedgevalleten: 3, waaronder de eerste nestvondst voor Texel.
Buiten de broedgevalleten in het voorjaar slechts 1 waarneming: 19 maart 1 De Koog; 30 april 1 TBWC; 17 mei 1 Eierlandse duinen. Tijdens najaartrek veel algemener met enkele tientallen waarnemingen tussen 19 september en 22 november. Een late waarneming voor Texel betreft 2 vogels op 2 december in de Staatsbossen.

Gauwe Vliegenvanger *Muscicapa striata*
Broedgevalleten: 110 in 1987.
Op 30 april eerste waarneming, daarna doortrekkend t/m 19 juni. Vanaf begin augustus t/m 18 oktober (vangst Korverskooi) vond najaartrek plaats. De laatste najaarsdatum was 17 oktober.

Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva*
Van 28-29 mei werd een tweede kalenderjaar mannetje gezien en zingend gehoord in de 'tuintjes', Eierlandse duinen.

Bonte Vliegenvanger *Ficedula hypoleuca*
Op 25 april eerste waarneming, daarna doortrekkend t/m 19 mei. In het najaar van 31 juli t/m 5 oktober.

Baardman *Panurus barbaricus*
Broedgevalleten: 10
Jaarvogel. Zelfs tijdens strenge vorst nog aanwezig, met bijvoorbeeld 5 op 5 januari in Molenkil. Vanaf de derde week van oktober komen vogels binnenvliegen over de noordkop en neemt het aantal in geschikt biotoop toe, zoals 100 op 18 oktober in de Hunsmeertjes.

Staartmees *Aegithalos caudatus europaeus*
Broedgevalleten: 16 (hoogste aantal ooit) jaarvogel. De volgende waarnemingen hebben mogelijk betrekking op trekkers: 21 t/m 25 maart 1 de Geul; 22 oktober 6 Korverskooi (vangst); 22 oktober 8 Rozendijk; 29 oktober 4 de Geul.

Zwarte Mees *Parus ater*
Broedgevalleten: 6

Het gehele jaar aanwezig. Vanaf begin oktober vond een kleine invasie plaats. In de daarop volgende late herfst en winter werden diverse vogels in en rond de dorpen gezien.

Pimpelmees *Parus caeruleus*

Broedgevallen: 194 in 1987

Jaarvogel. In oktober vond doortrek plaats van zeker enkele 10-tallen vogels. Bijvoorbeeld 30 oktober diverse groepjes van ca. 20 ex. vanuit Waddenzee landend op Dorpszicht.

Koolmees *Parus major*

Broedgevallen: 621 in 1987

Jaarvogel. Ook van deze soort vond doortrek plaats in oktober. Verdere gegevens ontbreken.

Boomkruiper *Certhia brachydactyla*

Broedgevallen: 50

Dit is het hoogste aantal ooit.

Jaarvogel. Er waren geen aanwijzingen voor trekbewegingen van buiten het eiland.

Buidelmees *Remiz pendulinus*

Van 27 april t/m 19 juni verbleef een mannetje, die 2 nesten bouwde, in de omgeving van de Geul/Horsmeertjes; 4 mei 1 de Muy; 19 augustus 1 zuid over TBWC; 1 oktober 1 de Geul.

Wielewaal *Oriolus oriolus*

Broedgevallen: dit jaar kon geen broedgeval worden vastgesteld.

Op 11 mei 1 mannetje Staatsbos; 13 mei 1 mannetje De Cocksdorp; 13 mei 1 noord over Krimbos; 21 mei 1 Noorderkooi; 7 juni 1 noord Krimbos.

Grauwe Klauwier *Lanius collurio*

Tussen 12 mei en 6 juni verbleven 17 vogels op het eiland. Daarvan waren 2 paren lange tijd aanwezig in de Bleekersvallei en de Westerduinen. Echter, deze kwamen uiteindelijk niet tot broeden. Tussen 9 augustus en 18 oktober werden nog eens 7 vogels waargenomen.

Klapekster *Lanius excubitor*

Op 29 maart 1 'tuintjes', Eierlandse duinen; 17 oktober 1 idem; 18 oktober 1 zuid over camping de Robbenjager; 30 oktober 1 'tuintjes', Eierlandse duinen.

Gaai *Garrulus glandarius*

Broedgevallen: 37, waarvan 33 in de Staatsbossen.

Jaarvogel. Na de invasie in het najaar 1996, verbleven er nogal wat vogels die lang bleven 'hangen'. Tot en met 31 mei was er nog noordwaarts gerichte trek: 7 noord bij de vuurtoren en 1 noord over Marsdiep. De waarneming van 2 zuidwaarts vliegende vogels op 22 juni in de Geul heeft mogelijk ook betrekking op deze achterblijvers.

Ekster *Pica pica*

Broedgevallen: 341 in 1987

Jaarvogel. Enkele gegevens: 10 januari 73 in de Nederlanden; 29 oktober groep van 53 bij Horsmeertjes. Grottere groepen van meer dan 20 vogels pendelen regelmatig tussen Vlieland en Texel.

Kauw *Corvus monedula spermolegus*

Broedgevallen: 638 in 1987

Het gehele jaar aanwezig.

Noordse Kauw *Corvus in monedula*

Gedurende de winter tot eind april verbleven enkele honderden 'halsvlek-Kauwen' voornamelijk in polder Eierland. Vanaf 24 september weer aanwezig en aantallen oplopend tot enkele honderden in december. Vrijwel alle vogels zullen tot deze ondersoort behoord hebben, maar mogelijk zijn ook enkele Russische Kauwen *Corvus in soemmerringii* aanwezig geweest.

Roek *Corvus frugilegus*

Op 8 maart 1 noord Loosdamsduin; 30 maart 1 Hoenderweg; 1 mei 1 noord Konvenskooi; 3 mei 1 noord de Muy; 13 mei 1 waddendijk De Cocksdorp; 18 oktober 1 bij vuurtoren uit zee komend.

Bonte Kraai *Corvus cornix*

Tot en met 29 mei maximaal 5 voornamelijk

lijk in de Slufter en de Hanenplas. Vanaf 26 september weer aanwezig. Bij de Slufter en de Hanenplas werden maximaal 5 vogels geteld. Er zullen totaal niet meer dan 7 vogels op het eiland aanwezig zijn geweest. Vanaf 28 september verbleef een hybride Bonte Kraai x Zwarte Kraai *C. corone* op de noordkop.

Zwarte Kraai *Corvus corone*

Broedgevalen: 98 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. 's Zomers verblijven ook niet territoriale vogels bijvoorbeeld in polder Eierland.

Spreeuw *Sturnus vulgaris*

Broedgevalen: 1222 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. In het najaar in groot aantal doortrekkend. Geen nadere gegevens bekend. Op 2 oktober verbleef een gedeeltelijk albinistische vogel in het Hoornder Nieuwland.

Spaanse Mus *Passer hispaniolensis*

Van 4 t/m 15 mei verbleef een adult mannetje op het terrein van het TBWC. Dit betrof de eerste waarneming in Nederland.

Huisamus *Passer domesticus*

Broedgevalen: circa 2400 in 1987

Het gehele jaar aanwezig.

Ringmus *Passer montanus*

Broedgevalen: 221 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. Kleine aantallen in Den Burg zoals 12 t/m maart in de Mars. Trek t/m 11 mei met 30 ter plaatse op terrein TBWC. Vanaf september weer trek, met soms honderden per dag zuid bij vuurtoren. Vanaf het late najaar vele tientallen op en rond erven in buitengebied.

Vink *Fringilla coelebs*

Broedgevalen: 196 in Staatsbossen, het hoogste aantal ooit.

Jaarvogel. In het najaar in groot aantal doortrekkend. Geen nadere gegevens bekend.

Keep *Fringilla montifringilla*

In winter in klein aantal aanwezig zoals 5

februari 5 Staatsbossen. Tot en met 29 mei 11 mannetje Dorp-zicht werd trek geconstateerd. Vanaf 19 september weer aanwezig, daarna doortrekkend tot in november met soms grote groepen van 100+ vogels op akkers. In december nog tientallen op diverse plaatsen aanwezig.

Europese Kanarie *Serinus serinus*

Op 28 juni 1 vrouwtje terrein TBWC; 31 juli 1 Den Burg; 21 september 1 Hoornder Nieuwland; 27 september 1 zuid 'tuintjes', Eierlandse duinen.

Groenling *Carduelis chloris*

Broedgevalen: 376 in 1987

Het gehele jaar aanwezig. Er zijn geen nadere gegevens bekend.

Britse Putter *Carduelis carduelis britannica*

Broedgevalen: 24-28 in 1990

Jaarvogel. In winter in grotere groepen aanwezig, zoals 20 in januari en februari in Den Burg. Over trekbewegingen is weinig bekend, maar vaststaat dat deze optreden van oktober tot in april. Mogelijk heeft een deel van de waargenomen vogels betrekking op de Continentale Putter *C. c. carduelis*.

Sijs *Carduelis spinus*

Broedgevalen: 2 leen nest van deze soort is op Texel nog nooit gevonden

Het gehele jaar aanwezig. In winter grotere groepen, bijvoorbeeld 70 op 14 januari in Staatsbossen en 7 maart 100+ in Den Burg. Voorjaartrek vond plaats t/m 19 mei. De waarneming van een paartje van 9 t/m 18 juni op het terrein van het TBWC is moeilijk te plaatsen. Op 19 september weer aanwezig. Aantallen daarna toenemend, met in het late najaar 100-sten aanwezig.

Kneu *Carduelis cannabina*

Broedgevalen: 522 in 1987

Eind februari arriveerden de eerste vogels. Vanaf september vond weer trek plaats, bijvoorbeeld 20 september enkele honderden op noordkop. In november nog enkele aanwezig, maar daarna geheel verdwenen.

Frater *Carduelis flavirostris*

Tot en met februari een groep van ca. 30 vogels aanwezig in de Slufter. Pas vanaf 23 oktober (75 jaar De Cocksdoorp) werd de soort weer gezien, voornamelijk in laatsge-noemd gebied en in de Slufter. Het hoogste aantal dat werd gezien bedroeg ca. 125.

Grote flamsijs *Carduelis flammea*

Godotende de winter tientallen aanwezig t/m eind maart, bijvoorbeeld 3 februari 40 Krimbos. In het najaar geen zekere waarnemingen van deze soort.

Kleine Barmijs *Carduelis cabaret*

Broedgevallen: 6

In de winter afwezig. In het voorjaar t/m 23 mei doortrekkend. Op 9 augustus werd een adult mannetje op het terrein van het TBWC gezien. Dit betrof waarschijnlijk 'post-breed-ing dispersal'. Op 13 september werd weer trek vastgesteld, die doorging t/m eind oktober.

Kruisbek *Loxia curvirostra*

Broedgevallen: er werden dit jaar geen broedgevallen vastgesteld.

De eerste 20 vogels werden op 30 mei waargenomen in de Staatsbossen. Daarna 10-tallen doortrekkend, verspreid over het eiland, met o.a. 70 op 3 oktober in de Staatsbossen. Vervolgens t/m december enige 10-tallen aldaar verblijvend.

Roodmus *Capodacus erythrinus*

Broedgevallen: 6-8

De eerste werd op 18 mei waargenomen in de Ruige Hoek. Doortrek van enkele tientallen vogels vond plaats t/m 29 juni. De laatste waarneming betrof vier van 2 juveniele vogels van een lokaal broedpaar op het terrein van het TBWC op 2 augustus.

Goudvink *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

De enige waarneming in de eerste helft van het jaar betrof die van een mannetje in de eerste week van april op Dorpzicht. In het najaar weer vanaf 29 september aanwezig, met 1 omgeving reddingsbootschuur en 1 Staatsbossen. Daarna werden nog 12 vogels

waargenomen en 4 vogels gevangen in de Korverskooi.

Appelvink *Coccothraustes coccothraustes*

Op 2 maart verbleven 2 vogels al enkele dagen bij De Koog; 25 maart 1 overvliegend terrein TBWC; 30 april 1 camping Slufter-vallei. Tussen 24 mei en 23 juli enkele waarnemingen van telkens 1 vogel in omgeving Staatsbossen; op 7 juni 1 overvliegend boven de Geul. In het najaar werden tussen 28 september t/m 18 oktober 6 vogels waargenomen.

Ijsgors *Calcarius lapponicus*

Deze soort wordt vrijwel nooit in de winter waargenomen. Daarom zijn de volgende opgegeven waarnemingen erg opmerkelijk: 10 januari 12 de Slufter; 12 januari 8 de Nederlanden; 15 januari 10 de Schoren. Vanaf 10 maart t/m 4 mei werden 7 vogels waargenomen. Op 27 september bevond de eerste zich weer bij RWZI De Cocksdoorp. Daarna regelmatig t/m 22 oktober voornamelijk op de noordkust. Verderom opmerkelijk is een waarneming van 8 op 11 december op het Alloo.

Sneeuwgorst *Plectrophenax nivalis*

In de winter t/m eind februari ca. 250, met als grootste groep 115 op 2 januari bij 't Horntje. In maart nog slechts 10-tallen met als laatste waarnemingen 2 op 27 maart bij 't Horntje. De eerste werden weer waargenomen op 16 september bij Minkewaal. Pas eind oktober en in november liep het aantal op tot c. 300. De meeste (1800) bevonden zich op de Hoes.

Geelgors *Emberiza citrinella*

Opvallend is het ontbreken van voorjaars-waarnemingen. Op 18 oktober vloog de eerste zuid over de Mui, daarna tot in november enkele tientallen doortrekkend.

Ortolaan *Emberiza hortulana*

Eén van deze soort werden geen voorjaars-waarnemingen bekend. Op 31 augustus een eerste-winter op terrein TBWC; 4 september idem; 18 september 1 zuid over 't Horntje'.

Eierlandse duinen; 27 september idem; 28 september 1 Nederlanden.

Dwerggors *Emberiza pusilla*

Op 2 mei werd een adult enige tijd waargenomen in de Eierlandse duinen. Dit betreft de zevende waarneming en het eerste voorjaarsgeval voor Texel.

Rietgors *Emberiza schoeniclus*


Broedgevallen: 166 in 1987

De eerste waarneming werd gedaan op 5 maart op de noordkop. Vanaf de tweede helft van september doortekkend, met alleen al circa 150 in Nederlanden op 30 september. Aantal in november snel afnemend en van december werden geen waarnemingen meer bekend.


Bijlage 1

Overzicht van de ontwikkeling van de broedvogelpopulatie van een aantal soorten


Lepelaar
Platalea leucorodia




Bruine Kiekendief
Circus aeruginosus




Blauwe Kiekendief
Circus cyaneus






Boornvalk
Falco sublineatus




Grutto
Limosa limosa




Neomemius arcuata

*Tritinga melanotos**Larus canus*


Zilvermeeuw
Larus argentatus




Dwergsterne
Sterna albifrons




Zomertortel
Streptopelia turtur




Ransuil
Asio otus




Boompieper
Ardeus trivialis




Roodbresttapuit
Saxicola torquata




Goudhaan
Regulus regulus




Zwarte Mees
Parus ater



Boomkruiper
Certhia brachyotryla



Kleine Barmseijs
Carduelis cabaret



Bijlage 2

Resultaten activiteiten Ringgroep Korverskaan

	Soort	CES	overig	totaal
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>		2	2
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>		3	3
Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>		1	1
Huutsnip	<i>Scolopax rusticola</i>		3	3
Houdduif	<i>Columba palumbus</i>		4	4
Ransuil	<i>Asio otus</i>		2	2
Draaihals	<i>Lynx torquilla</i>		2	2
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	1		1
Boompieper	<i>Anthus trivialis</i>		1	1
Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>	18	69	87
Heggenmus	<i>Prunella modularis</i>	3	20	23
Roodhoest	<i>Erithacus rubecula</i>	9	134	143
Gekraagde Roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		23	23
Paap	<i>Saxicola rubetra</i>		1	1
Roodhoesttaai	<i>Saxicola torquata</i>	2	0	2
Merel	<i>Turdus merula</i>	4	678	682
Kraamvogel	<i>Turdus pilaris</i>		24	24
Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>		67	67
Kopewick	<i>Turdus iliacus</i>		87	87
Sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia</i>	1	1	2
Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		1	1
Kleine Kreeklief	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	20	21
Spruitvogel	<i>Hippobos icterina</i>	3	3	6
Braamsluiper	<i>Sylvia curruca</i>	7	3	10
Grasmus	<i>Sylvia communis</i>	20	10	30
Tuinflieter	<i>Sylvia borin</i>	7	56	63
Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>		395	395
Bladkoning	<i>Phylloscopus inornatus</i>		3	3
Tijthjal	<i>Phylloscopus collybita</i>	20	52	72
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	11	23	34
Goudhaan	<i>Regulus regulus</i>		129	129
Vuurgoodhaan	<i>Regulus ignicapillus</i>		7	7
Grauwe Vliegenvanger	<i>Muscicapa striata</i>		3	3
Ronde Vliegenvanger	<i>Ficedula hypoleuca</i>	2	13	15
Staatmees	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>		6	6
Pingelmees	<i>Parus caeruleus</i>	7	51	58
Koolmees	<i>Parus major</i>	8	45	53
Gaai	<i>Garrulus glandarius</i>	1		1
Ekster	<i>Pica pica</i>	1		1
Vink	<i>Fringilla coelebs</i>		55	55
Keip	<i>Fringilla montifringilla</i>		35	35
Groenling	<i>Carduelis chloris</i>		1	1
Sips	<i>Carduelis spinus</i>		31	31
Kneus	<i>Carduelis cannabina</i>	4		4
Noordse Goutvink	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>		5	5
Rietgors	<i>Emberiza schoeniclus</i>		2	2
Totaal	46 soorten	150	2071	2221

Terugmeldingen geringde vogels Korverskooi 1997

Sperwer .1087015

GERINGDE: Westermient, Texel; 4-7-1997; man; 1k; tals nestjong geringd
TERUGGEHELD: Korverskooi; 10-9-1997; gecontroleerd
AFSTAND: 8 km; richting: 24 graden; verstreken tijd: 68 dagen

Sperwer .3464900

GERINGDE: Korverskooi; 24-11-1994; vrouw; 1k
TERUGGEHELD: De Waal; 15-4-1997; gemeld als duit; dood; gevonden
AFSTAND: 4 km; richting: 163 graden; verstreken tijd: 873 dagen

Merel K.921261

GERINGDE: Korverskooi; 2-11-1994; man; na 1k
TERUGGEHELD: Froyland (Sokodali), Rogaland, Noorwegen; 5821N,0618E; 2-11-1997;
dood; verkeerslachtoffer
AFSTAND: 589 km; richting: 9 graden; verstreken tijd: 1096 dagen

Merel K.957508

GERINGDE: Korverskooi; 2-11-1995; vrouw; 1k
TERUGGEHELD: Whittington, Chesterfield, Groot-Britannie; 5316N,0125W; 5-2-1997;
dood < 1 week; gepakt door kat
AFSTAND: 414 km; richting: 272 graden; verstreken tijd: 463 dagen

Merel K.957615

GERINGDE: Korverskooi; 4-11-1995; man; 1k
TERUGGEHELD: Kilssea, Humberside, Groot-Britannie; 5337N,0008E; 2-11-1997;
gecontroleerd
AFSTAND: 314 km; richting: 280 graden; verstreken tijd: 729 dagen

Merel K.959996

GERINGDE: Korverskooi; 23-10-1996; vrouw; 1k
TERUGGEHELD: De Koog; 10-2-1997; dood; gepakt door roofvogel
AFSTAND: 5 km; richting: 222 graden; verstreken tijd: 110 dagen

Merel K.972839

GERINGDE: Korverskooi; 8-11-1996; vrouw; 1k
TERUGGEHELD: Hessle, Humberside, Groot-Britannie; 5343N,0025W; 17-1-1997;
dood; gevonden
AFSTAND: 352 km; richting: 281 graden; verstreken tijd: 70 dagen

Merel RI.61340

GERINGDE: Soomundham, Suffolk, Groot-Britannie; 5211N,0126E; 26-1-1996;
man; na 2k
TERUGGEHELD: Korverskooi; 31-10-1997; gecontroleerd
AFSTAND: 250 km; richting: 65 graden; verstreken tijd: 644 dagen

Zanglijster K.959857

GEBOORTE: Korverskooi; 24-9-1996; geslacht onbekend; 1kj
 TERUGKOMST: Braganca, Trás-os-Montes, Portugal; 4130N,0651W; 15-2-1997;
 dood < 1 week; geschoten
 AFSTAND: 1558 km; richting: 214 graden; verstreken tijd: 144 dagen

Koperwiek H.176573

GEBOORTE: Korverskooi; 6-10-1996; geslacht onbekend; 1kj
 TERUGKOMST: Oud Turnhout, Antwerpen, België; 5119N,0459E; 13-10-1997;
 gecontroleerd
 AFSTAND: 200 km; richting: 176 graden; verstreken tijd: 372 dagen

Rietzanger F.915697

GEBOORTE: Vlieland (de Kroonsgolders); 14-8-1997; geslacht onbekend; 1kj
 TERUGKOMST: Korverskooi; 22-8-1997; gecontroleerd
 AFSTAND: 18 km; richting: 214 graden; verstreken tijd: 8 dagen

Fitis UJL.1582

GEBOORTE: Groenhergen, Oost-Vlaanderen, België; 5103N,0406E; 30-8-1995;
 geslacht onbekend; 1 kj
 TERUGKOMST: Korverskooi; 8-5-1997; vrouw; na 1kj; gecontroleerd
 AFSTAND: 235 km; richting: 12 graden; verstreken tijd: 617 dagen

Goodhaan M.77090

GEBOORTE: Korverskooi; 14-10-1997; man; 1kj
 TERUGKOMST: Almere (Kromlootpark); 18-10-1997; gecontroleerd
 AFSTAND: 90 km; richting: 164 graden; verstreken tijd: 4 dagen

Koolmees B.884818

GEBOORTE: Korverskooi; 11-5-1996; vrouw; 2kj
 TERUGKOMST: De Koug; 24-2-1997; dood > 1 week; gevonden
 AFSTAND: 5 km; richting: 222 graden; verstreken tijd: 289 dagen

Gaai.1286215

GEBOORTE: Korverskooi; 18-10-1996; geslacht onbekend; leeftijd onbekend
 TERUGKOMST: De Koug; 30-1-1997; dood < 1 week; tegen glas geslagen
 AFSTAND: 2 km; richting: 211 graden; verstreken tijd: 104 dagen

Sijs F.907524

GEBOORTE: Korverskooi; 19-11-1996; vrouw; na 1kj
 TERUGKOMST: Halfweg, Terschelling; 5-4-1997; dood < 1 week; verkeerslachtoffer
 AFSTAND: 41 km; richting: 47 graden; verstreken tijd: 137 dagen

Bijlage 3

Resultaten SOVON watvogeltellingen

	Soort	12 jan	23 feb	27 jun	16 nov
Knobbelzwaan	<i>Cygnus olor</i>	2	9	21	12
Zwarte Zwaan	<i>Cygnus atratus</i>				2
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	180			489
Toendrarietgans	<i>Anser semipalmatus</i>	2260			673
Kleine Rietgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>				20
Grauwe Gans	<i>Anser a. anser</i>	266	530	345	821
Kolgan	<i>Anser a. albifrons</i>	40	630		10
Brandgans	<i>Branta leucopsis</i>		6	1	
Zwartbuikrogans	<i>Branta bernicla</i>	914	7746	7	10123
gans spec	<i>Anser/Branta sp.</i>	2			
Bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>	298	683	363	1464
Tafeleend	<i>Aythya ferina</i>	60	57	52	46
Kuifeend	<i>Aythya fuligula</i>	108	179	140	118
Topper	<i>Aythya marila</i>	12780	1		1
Eider	<i>Somateria mollissima</i>	4189	1448	1863	4448
Zwarte Zee-eend	<i>Melanitta nigra</i>	4	12		2
Grote Zee-eend	<i>Melanitta fusca</i>	25			
IJseend	<i>Clangula clangula</i>	200		7	
Nonnetje	<i>Mergus albellus</i>	2	2		
Bildduiker	<i>Ilucophala clangula</i>	1536	136		114
Grote Zaagbek	<i>Mergus mergamus</i>	7	1		1
Middelste Zaagbek	<i>Mergus serrator</i>	154	52		73
Krakeend	<i>Mareca strepera</i>	1	24	25	29
Smeent	<i>Mareca penelope</i>	18251	8560	7	10125
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	15	26	29	193
Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	2585	2422	1038	2838
Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>	16	42		109
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	26	146	6	458
eend spec	<i>Anas/Aythya sp.</i>	800		50	
Roodkeelduiker	<i>Gavia stellata</i>		5		
Parelduiker	<i>Gavia arctica</i>		17		
Doflaars	<i>Tachybaptus ruficollis</i>			7	2
Fuut	<i>Podiceps cristatus</i>	21	11	53	67
Roodhalsfuut	<i>Podiceps griseigena</i>	3		1	1
Kuifduiker	<i>Podiceps auritus</i>	1			2
Gecorde Fuut	<i>Podiceps nigricollis</i>			145	26
Jan van Gent	<i>Morus bassana</i>			2	
Aalscholver	<i>Phalacrocorax c. sinensis</i>			389	24
Blauwe Reiger	<i>Ardea cinerea</i>		21	26	24
Lepelaar	<i>Platalea leucorodia</i>		8	302	
Wateral	<i>Rallus aquaticus</i>				2
Waterhoen	<i>Gallinula chloropus</i>	55	24	18	41

	Soort	12 jan	23 feb	27 jun	16 nov
Meerkoet	<i>Fulica atra</i>	210	240	410	273
Scholekster	<i>Haematopus ostralegus</i>	885	8517	4890	6118
Kluut	<i>Avosetta recurvirostra</i>		37	60	111
Bontbekplevier	<i>Charadrius h. hiaticula</i>		15	40	33
Goudplevier	<i>Pluvialis apricaria</i>		1584	122	5501
Zilverplevier	<i>Pluvialis squatarola</i>		17	205	370
Kievit	<i>Vanellus vanellus</i>	5	2642	1417	2905
Kanoetstrandloper	<i>Calidris canutus</i>	266	41	26	129
Drieteenstrandloper	<i>Calidris alba</i>		93		88
Paarse Strandloper	<i>Calidris maritima</i>	2			
Bonte Strandloper	<i>Calidris alpina</i>	33	62	141	1620
Kempfaan	<i>Philomachus pugnax</i>			111	20
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	1	10	3	63
Grutto	<i>Limosa limosa ssp</i>		33	137	7
Rosse Grutto	<i>Limosa lapponica</i>		692	7791	518
Regenwulp	<i>Numenius phaeopus</i>			40	
Wulp	<i>Numenius arquata</i>	553	5698	5162	2214
Zwarte Ruiter	<i>Tringa erythropus</i>			142	39
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	22	101	2948	441
Groenpootruiter	<i>Tringa nebularia</i>			1763	78
Witgat	<i>Tringa ochropus</i>			14	3
Bonruiter	<i>Tringa glareola</i>			2	
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>			17	
Steenloper	<i>Arenaria interpres</i>	21	23	315	167
Grote Ijgier	<i>Catharacta skua</i>			1	
Zwartkopmeeuw	<i>Larus melanocephalus</i>			2	
Kokmeeuw	<i>Larus ridibundus</i>	889	1403	6462	1652
Stormmeeuw	<i>Larus canus</i>	3960	4261	6053	4885
Kleine Mantelmeeuw	<i>Larus fuscus</i>	187	112	1739	11
Zilvermeeuw	<i>Larus argentatus</i>	1651	5742	5184	2763
Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>	454	206	93	1433
Drieteenmeeuw	<i>Rissa tridactyla</i>		1	1	
"meeuw"	<i>Larus ssp</i>	25	209	705	
Grote Stern	<i>Sterna sandvicensis</i>			1199	
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>			160	
Dwergster	<i>Sterna albifrons</i>			81	
Visdief/Noordse Stern	<i>Sterna hirundo/paradisaea</i>			244	
Zeekoet	<i>Uria aalge ssp</i>	1	1		
Totaal		53966	54538	52777	64020

Overzicht van de gebieden waar de watvogeltellingen plaatsvonden

- 1 Hors
- 2 Strand paal 9-12
- 3 Strand paal 12-15
- 4 Strand paal 15-20
- 5 Strand paal 20-25
- 6 Strand paal 25-31
- 7 Mok
- 8 Schorren
- 9 Polder Wassenaar en Zeeburg
- 10 Slufter
- 11 Honsmeentjes en de Geul
- 12 Grote Vlak en Pompevlak
- 13 Korvenkooi
- 14 Muy
- 15 Prins Hendrikpolder en Zuidhaffel
- 16 Hoorder Nieuwland
- 17 De Westen en De Hemmer
- 18 Den Burg en Oudeschild
- 19 Oosterend en Dijkmanshuizen
- 20 Waalenburg
- 21 Eversteekong
- 22 Polder Het Noorden
- 23 Polder Eijerland Zuid
- 24 De Nederlanden
- 25 Polder Eijerland Noord

